

Zool.

290

cgs

Zool. 290 cg<sup>s</sup>

Koch





DIE  
MYRIAPODENGATTUNG  
**LITHOBIUS**

DARGESTELLT

VON

**DR. LUDWIG KOCH.**



MIT ZWEI LITHOGRAPHIRTEN TAFELN DER AUGENSTELLUNGEN.



NÜRNBERG, 1862.

VERLAG VON J. L. LOTZBECK.



Biellings Druck (Dietz) in Nürnberg.

## V O R W O R T.

---

**Brandt** in **Wagner's** Reisen in der Regentschaft Algier, Band III. S. 285, bemerkt: »Die Arten der Gattung *Lithobius* bedürfen einer genauen, kritischen Untersuchung, die kaum auf andere Grundlagen als auf exakte Beschreibungen und Abbildungen der von **Leach** (*Zoolog. Miscell.*) aufgestellten Formen wird basirt werden können.« Diess gab mir Anlass, dieser Gattung meine volle Aufmerksamkeit zuzuwenden, um, wenn auch nicht in dem Sinne, wie **Brandt** es verlangt, die Aufgabe von mir gelöst werden konnte, doch durch sorgfältige Untersuchung einer möglichst grossen Zahl dieser Thiere einige Beiträge zu ihrer genaueren Kenntniss zu liefern. Nach mehrjährigen Beobachtungen glaube ich nunmehr das Resultat derselben veröffent-

lichen zu dürfen. Zugleich fühle ich mich verpflichtet, meinen besten Dank für die vielfache freundliche Unterstützung durch Mittheilung von Material und Literatur auszusprechen.

Nürnberg im September 1862.

**Koch.**



## Die Gattung *Lithobius*.

---

Die Klasse der Myriapoden zerfällt in zwei Ordnungen, — die der Chilognathen Latr. (6—7gliederige Fühler, die äussern Geschlechtstheile am 4. oder 7. Körpersegment, an den ersten drei Körperringen je 1, an den übrigen 2 Beinpaare) und der Syngnathen (Chilopoda) Latr. (vielgliederige Fühler, nur ein Beinpaar an den Körpersegmenten, die Genitalien am Ende des Körpers). —

Bei den Syngnathen sind zwei Unterordnungen zu unterscheiden, wovon die erste — *Schizotarsia* Brandt — durch vielgliederige Tarsen, die zweite — *Holotarsia* Brandt — durch dreigliederige Tarsen charakterisirt erscheint.

Zu den Holotarsien gehört die Familie der Lithobien; der Körper derselben besitzt 9 grössere und 6 kleinere Rückenschilde mit je einem Beinpaare und zwei Endsegmente ohne Beine; die Hüften der letzten vier Beinpaare haben Oeffnungen.

Die Familie der Lithobien besteht nur aus zwei Gattungen: *Lithobius* Leach und *Henicops* Newp.; letzteres Genus hat beiderseits nur ein Auge, während bei *Lithobius* neben einem grössern Auge stets eine grössere oder geringere Anzahl meist kleiner Augen vorhanden ist. —

Die Gattung *Lithobius* wurde von Leach (Linn. Trans. XI. p. 381) aufgestellt, während sie bis dahin unter den Scolopendern ihren Platz hatte. Es war überhaupt vor Leach nur eine Art (*Lithob. forficatus* Linn.) bekannt. Unter diesem Einen Namen wurden jedenfalls Lithobien aus den verschiedensten Gegenden begriffen, welche kaum einer einzigen Species angehören konnten; jedoch sind die Beschreibungen des *Lithob. forficatus* bei den früheren Autoren so unvollständig, dass die

dort angegebenen Merkmale allen Arten dieser Gattung gemeinsam zukommen.

Erst Leach unterschied mehrer Arten und nach ihm haben Say (Journ. of the Acad. of Nat. sciences of Philadelphia) — Risso (Europ. merid.) — Gervais (Ann. scienc. nat. — Aptères) — Forstrath Koch (System der Myriapoden) — Newport (Catol. of the Myriap. in the coll. of the Brit. Mus.) und Andere die Zahl der Arten bedeutend vermehrt.

Es ist nicht wohl möglich, die Gesamtzahl der bis jetzt bekannt gemachten Arten genau anzugeben, indem bei den äusserst variablen Merkmalen der einzelnen Arten die bisherigen Beschreibungen zum sichern Erkennen der Species ungenügend sind und einzelne wichtige Charaktere mit einseitiger Berücksichtigung minder constanter Merkmale ganz übergangen wurden; während bei diesen Thieren nur das Gesamtbild, aus der Uebereinstimmung einer grössern Menge von Exemplaren componirt, die erforderliche Sicherheit zur Bildung einer neuen Art gewähren kann.

Abgesehen von der Möglichkeit mannigfacher Täuschung sind mit Einschluss der von mir aufgestellten 27 neuen Species wahrscheinlich 63 Arten beschrieben, nämlich von Leach, Gervais und Newport 19, von Forstrath Koch 2 Arten, sämmtlich nach den gegebenen Beschreibungen zu keiner der meinen gehörend, und von mir 42 Species (unter welchen 15 bereits bekannte Arten). Ich habe leider nur in einem sehr engen Gebiete selbst sammeln können und ausserdem noch durch freundliche Mittheilung einige auswärtige Arten erhalten. Würde dieser Gattung grössere Aufmerksamkeit zugewendet, so könnte die Zahl der Arten wohl noch bedeutend vermehrt werden.

Die Ungewissheit über die bisher bekannt gemachten Arten kann nur dann gehoben werden, wenn die Original Exemplare, besonders jene des britischen Museums, noch einmal genau und mit Berücksichtigung aller erforderlichen Merkmale beschrieben werden, — ein Wunsch, den schon Brandt (Wagner's Reisen in der Regentschaft Algier, Band III. S. 285) aussprach, welcher aber auch durch die neuern Arbeiten von Newport nicht in Erfüllung ging.

## Körperbedeckung.

Alle Gebilde, welche die innern Organe und deren Mündungen theils als hornige, chitinhaltige, theils als weiche Bedeckung und Verbindungstheile umhüllen, und welche bei dem Häutungsvorgange als leere Hülle zurückbleiben, machen das Integument der Lithobien aus. Ein Theil dieser Gebilde wird bei der Beschreibung der Fresswerkzeuge, der Geschlechts-, Respirations-, Tast- und Bewegungsorgane aufgeführt werden.

Der Kopfschild der Lithobien ist von verschiedener Gestalt (herzförmig, rundlich, quadratisch oder länglich viereckig), — oben meist abgeplattet und in den Seiten hervorgewölbt, bald mehr, bald weniger fein oder grob eingestochen punktiert, glatt oder uneben, mit zerstreuten Borsten besetzt oder kahl. Bei dem Häutungsvorgang zerfällt derselbe in seine drei ursprünglichen Theile, —

1) das Schädelsegment, die grössere hintere Parthie des Kopfschildes bildend, von einem durch eine Furche abgetrennten, aufgeworfenen Rande eingefasst, welcher sich nach unten scharfkantig umschlägt, —

2) das Stirnsegment, durch eine mehr oder weniger feine Furchenlinie in seiner Abtrennung vom Schädelsegment angedeutet. Von Newport wird dieser Theil als subsegmentum antennale betrachtet, — es ist aber ein wirkliches Segment, welches sich bei der Häutung vollständig ablöst und nicht die Fühler an sich trägt, —

3) das Augenfühlersegment von der Mitte des Seitenrandes bis zu den Fühlern reichend, die Augen und die Wurzel der Antennen umfassend. —

Der übrige Rücken der Lithobien ist mit 15 Schilden gedeckt, nämlich 9 grösseren (Haupt-) und 6 kleineren (Zwischen-) Schilden, welche letztere folgendermassen vertheilt sind: der erste Zwischenschild befindet sich zwischen dem 1. und 2. Hauptschilde, der zweite zwischen dem 2. und 3., der dritte zwischen dem 3. und 4., der vierte zwischen dem 5. und 6., der fünfte zwischen dem 6. und 7., der 6. zwischen dem 7. und 8. —

Der erste Hauptschild hat am Vorderrande einen halb-

mondförmigen Randumschlag, aufgeworfenen Seiten- und Hinterrand und ist immer nach hinten mehr verschmälert als die übrigen. Die andern Hauptschilde besitzen alle einen deutlichen, mehr oder weniger breit aufgeworfenen Vorderrand und eben solche Seitenränder, während der Hinterrand meist nur wenig oder gar nicht aufgeworfen ist. Die Rückenschilde decken sich mit ihren freien Hinterrändern dachförmig.

An einzelnen Haupt- und Zwischenschilden verlängert sich die Hinterrandsecke in einen Zahnfortsatz; jedoch kommen nur am vierten Haupt- und den vier hintern Zwischenschilden solche Zahnfortsätze vor.

Die Rückenschilde sind entweder glatt, runzelig oder granuliert; behaart oder kahl; mehr oder weniger gewölbt.

Ausser diesen hartpanzerigen Rückenschilden sind noch am Ende des Körpers zwei von weicherem Integumente gebildet, vorhanden, wovon der letzte den After überdeckt.

Eigentliche Bauchschilde (den letzten zum Geschlechtsapparat gehörenden Halbring abgerechnet) sind 15 vorhanden; von diesen sind die ersten beiden kürzer als die andern. Die Bauchschilde entsprechen bezüglich ihrer Lage genau den Rückenschilden, sie sind immer flach, meist glatt, gewöhnlich behaart und haben eine mehr oder weniger deutliche Mittelfurche, oft auch ein kleines Grübchen in der Mitte. Sie haben nie aufgeworfene Ränder.

Die Rückenschilde sind unter sich und mit den Bauchschilden durch eine weiche, tiefgefaltete und daher sehr ausdehnbare, die Körperbewegung nach allen Richtungen gestattende Haut verbunden.

### Pigmentirung.

Alle chitinhaltigen Gebilde der Lithobien sind braun gefärbt und zwar in den verschiedensten Schattirungen vom lichten Hellbraun bis in's tiefe Schwarzbraun; selbst die innern chitinhaltigen Lufröhren zeigen diese braune Färbung. Die helleren oder dunklern inneren Organe scheinen durch den Chitinpanzer durch, zuweilen sind jedoch auch wirkliche dunkle Schattirungen der Körperschilde (*Lithob. festivus* mih.) vorhanden.

Die Lithobien enthalten, im ganzen Körper verbreitet, ein

blaues Pigment, welches an allen Stellen, wo die äussern Integumente dünnhäutig sind, durchscheint, besonders schön aber an frischgehäuteten Thieren zu beobachten ist. Im letztern Falle scheint das Chitin der Körperbedeckung durch Einwirkung der Luft einer chemischen Veränderung zu unterliegen, denn sämtliche Theile des Integuments sind weiss und erhalten erst allmählig ihr braune Färbung. Bei solchen frisch gehäuteten Thieren scheint das blaue Pigment violett durch und tritt erst deutlich hervor, wenn die Thiere in Weingeist gelegt werden; dann erscheinen die Rückenschilde und der Kopf schön hellblau mit dunkelblauer netzaderiger Zeichnung; die Fühler hellblau mit weisser Spitze, die Beine weiss mit durchscheinendem Blau. Dieses Pigment scheint hauptsächlich in der Muskulatur und einem Theil der drüsigen Organe verbreitet zu sein, — Léon Dufour will es am intensivsten in den Speicheldrüsen beobachtet haben.

### Fresswerkzeuge.

Die Fresswerkzeuge der Lithobien sind von dem Kopfschilde überdeckt, bloss die Lippentaster treten theilweise über den Seitenrand des Kopfes hervor.

Durch ihre Grösse und oberflächliche Lage fallen zuerst die Unterlippe und die beiden Lippentaster in die Augen.

Die Unterlippe hat die Form eines Dreiecks, dessen Spitze mehr oder weniger abgeschnitten ist, — sohin 4 Ränder, — zwei manchmal gerade, oft geschwungene oder ausgeschnittene Seitenränder, — einen Basalrand, dessen beide Hälften in der Mitte unter einem stumpfen Winkel zusammentreffen, und einen Vorderrand, welcher immer aufgeworfen und in der Mitte eingekerbt ist und eine Reihe von scharfen oder stumpfen Zähnen trägt. Die Zahl dieser Zähnen wechselt nach den verschiedenen Arten zwischen 4—18. Der Vorderrand ist entweder gerade, gebogen, oder beiderseits schräg gegen seine Mitte abgeschnitten. Indem die Unterlippe aus zwei mit einander verwachsenen Hälften zusammengesetzt ist, hat sie an der Vereinigungslinie beider eine tiefe Mittelfurche. Sie besteht aus zwei paarigen Blättern, einem obern und untern, letzteres ist convex, das obere Blatt concav, am Vorderrande in der scharfen, zahn-

tragenden Kante mit dem untern zusammenstossend; es hat ebenfalls eine Mittelfurche, ist aber an der Basis spitzwinklig tief ausgeschnitten. Dieser Ausschnitt dient zur Aufnahme eines aus derben Bündeln zusammengesetzten, keilförmigen Muskels, welcher mit breiter Basis unterhalb der Wurzelglieder beider Kinnladentaster entspringt und in der Spitze des Ausschnittes sich inserirt. Dieser Muskel dient zur Auf- und Abwärtsbewegung der Lippen. Der Raum zwischen dem oberen und unteren Blatt der Unterlippe schliesst jene Muskeln ein, welche die Bewegung derselben vor- und rückwärts vermitteln.

An jedem Winkel des Hinterrands der Unterlippe befindet sich ein kleiner Fortsatz, in welchem der Lippentaster eingelenkt ist. Die Lippentaster bestehen aus vier Gliedern, — das erste ist gerade nach vorn gerichtet, so lang als die drei andern miteinander, oben und unten plattgedrückt und aussen gerundet; — das zweite und dritte Glied sind sehr kurz, dicker als lang, ringförmig, sie vermitteln die knieartige Stellung des letzten Gliedes nach innen; dieses bildet eine aus breiter Basis in eine feine Spitze endende mehr oder weniger gebogene Kralle; an der Innenseite etwas oberhalb der Einlenkung ist dieses letzte Glied stark eingeschnürt.

Forstrath Koch (System der Myriapoden S. 66) nimmt sechs Glieder der Lippentaster an und bildet solche auch ab, der von ihm als erstes Glied betrachtete Theil ist aber der Fortsatz des äussern Winkels der Unterlippe, sein 5. Glied die oben erwähnte Einschnürung des Krallengliedes.

Degeer hat auf jeder Seite des letzten Gliedes der Lippentaster eine deutliche von der Spitze bis zum beweglichen Gelenk ziehende Rinne bemerkt, die an der einen Seite tiefer und bemerkbarer als an der andern ist, — Treviranus sah diese Furche nur auf der concaven Seite und zwar an allen vier Gliedern, — Forstrath Koch spricht von einer auf der Mundseite des Endgliedes befindlichen sehr feinen, kaum zu sehenden, nur in gewisser Richtung doch sich deutlich zeigende Giftritze. Bei der sorgfältigsten oft desshalb wiederholten Untersuchung konnte ich jedoch diese Beobachtungen nicht bestätigt finden.

Nach Wegnahme der Unterlippe und der Lippentaster zeigen sich die Kinnladentaster, ebenfalls paarig, aber an ihren

Wurzelgliedern fest mit einander verwachsen. Das erste Glied derselben ist flach, aus zwei durch eine feine Bogenfurche angedeuteten Theilen bestehend, beide Theile fast halbmondförmig, d. h. mit bogig ausgeschnittnem Vorderrande und halbkreisförmigem Hinterrande; der innere Theil ist mit dem der andern Seite fest verwachsen; der äussere fast noch einmal so gross als der innere. Wo beide aneinander gränzen ist aussen das zweite Glied eingelenkt, dieses ist sichelförmig gebogen, platt zusammengedrückt, hat in der Mitte des Innenrandes eine schwache Protuberanz, am Aussenrande eine Reihe langer gerader Borsten; — dieses Glied ist das längste und an seinem Ende etwas breiter als an der Basis. Das 3. Glied ist nur halb so lang als das vorhergehende, nicht so stark zusammengedrückt, an der Aussenseite ebenfalls borstig.

Das Endglied ist fast kegelförmig, so lang als das dritte, an der Aussenseite mit längern und kürzern Borsten; innen muschelartig ausgehöhlt. Der Rand dieser Aushöhlung ist mit anliegenden steifen Borsten, — diese selbst aber mit an ihrer obern Hälfte gefiederten Wimpern dicht besetzt. Am Ende dieses Glieds ist eine gekrümmte, tiefgespaltene Kralle, deren einer Theil kürzer als der andere ist.

Die ebenfalls paarige Kinnlade besteht aus drei Gliedern. Das Grundstück des ersten Gliedes, mit jenem der andern Seite verwachsen, verlängert sich in zwei Fortsätze, einen äussern flügelartigen, am Ende abgerundeten, welcher den Aussenrand des Kopfschildes beinahe erreicht, und einen innern nach vorn gerichteten, dessen Innenrand gerade und dessen Aussenrand gebogen ist; dieser Theil ist an seiner Spitze gewimpert, für sich selbst ist er nicht beweglich, sondern bewegt sich mit dem ganzen Wurzelglied der Kinnlade. Forstrath Koch hat ihn mit Recht als Zunge betrachtet. In dem Winkel, welchen die beiden Fortsätze des Wurzelgliedes bilden, ist das zweite kurze Glied eingelenkt; ihm folgt das dritte helmförmige, dessen freier Rand mit einer Reihe von Wimpern besetzt ist, welche in ihrer obern Hälfte gefiedert sind.

Die Oberlippe, unmittelbar unter der Kopfspitze liegend und mit ihr verwachsen, hat die Form eines gleichschenkligen Dreiecks, dessen freie, unter dem Kopfe vorstehende mit

5—6 starken Borsten besetzte Spitze einen kurzen Kegel vorstellt. Diese Spitze ist unten ausgehöhlt und von den dahinter liegenden Theilen durch eine vorspringende Bogenleiste abgegränzt. Die Grundlinie des Dreiecks, länger als dessen Schenkel, ist in der Mitte tief kreisförmig ausgeschnitten, der freie Rand dieses Ausschnittes mit Wimpern besetzt. In der Mitte desselben ist ein zweiter etwas stumpfwinkliger Ausschnitt, hinter welchem verborgen sich die beiden, mit kräftigen Zähnen bewehrten, beweglichen Kinnbacken befinden; diese sind durch zwei gebogene Hornplättchen gebildet, die an ihrem freien Ende fächerartig erweitert sind.

### Innere Dauungsorgane.

Bei den Lithobien, als von animalischer Nahrung lebenden Thieren, verläuft der Dauungscanal auf kürzestem, d. h. geradem Wege vom Munde zum After und ist sonach etwas kürzer als der Körper. Zwischen dem Hinterande des Oberkiefers, den Kinnladen und der Zunge befindet sich die Mundöffnung, welche in den dünnen und kurzen Oesophagus führt. Zu beiden Seiten der Speiseröhre, bis wo sie sich in den Magenschlauch erweitert, liegen die Speicheldrüsen in Form länglicher, aus kleineren Acinis zusammengesetzter Trauben. Treviranus sah dieselben als Fettkörper an, wahrscheinlich weil er keinen Ausführungsgang entdecken konnte; Léon Dufour hat sie als Speicheldrüsen erkannt, erwähnt aber ebenfalls ihre Ausführungsgänge nicht. Auch mir war es unmöglich, dieselben aufzufinden; wahrscheinlich werden sie immer bei der weichen Beschaffenheit des ganzen Organes während des Präparirens zerrissen und ziehen sich in die Drüsensubstanz zurück. Ungeachtet sie noch nicht gefunden worden, dürfte doch ihr Vorhandensein nicht geläugnet werden können, indem sie bei anderen Myriapoden nachgewiesen sind.

Der Magenschlauch ist an seinem hintern Ende eingeschnürt, worauf das Darmrohr bis zur Einmündung der Malpigh'schen Gefäße sich wieder erweitert. Letztere stellen zwei einfache, sehr feine Röhrchen vor, welche über den Speicheldrüsen verschlossen beginnend, in geschlängeltem Verlaufe zu beiden Seiten des Darmrohrs sich nach hinten ziehen und etwas



vor dem Rectum in den Darm einmünden. Léon Dufour sowie Treviranus hielten sie für Gallengefässe, — nunmehr werden sie mit ziemlicher Bestimmtheit für harnabsondernde Organe gehalten.

Hinter der Einmündung der Malpigh'schen Gefässe erweitert sich das Darmrohr, in das Rectum übergehend, wieder und endet als After in eine breite gebogene Querspalte über den äussern Geschlechtstheilen.

Die Structur der Wandung des Dauungsweges ist eine gleichmässige. Die Muskulatur ist sehr entwickelt und aus longitudinalen in regelmässigen Interstitien sich folgenden Längsfasern und einer dichten Kreisfaserschichte bestehend.

### Athmungsorgane.

Die Lithobien athmen durch Tracheen; die Stigmen derselben befinden sich in den weichen Seiten zwischen den Bauch- und Rückenschilden, ziemlich nahe den Hinterecken der letzteren; sie sitzen auf länglichen Wulsten in Form langer, enger, gebogener, mit aufgeworfenem Rande umgebener, schräggestellter Spalte; hinter den ersten beiden Stigmen ist noch ein ähnlicher Wulst vorhanden.

Auf jeder Seite befinden sich sechs solcher Stigmen, nämlich je eines unter dem 3., 5., 8., 10., 12. und 14. Rückenschild.

Treviranus gibt 7 Stigmen an, das erste derselben unter dem ersten Rückenschild, — hier ist aber kein eigentliches Stigma vorhanden, sondern nur der Wulst, welcher auch hinter dem Stigma am 3. und 5. Rückenschild zu bemerken ist; sonach ist auch die Abbildung bei Treviranus unrichtig. Die in Tab. VI. Fig. 6. Nr. 1. abgebildete Trachee ist nur ein Zweig des von dem 1. Stigma unter dem 3. Rückenschild ausgehenden, nach dem Kopfe verlaufenden grössern Tracheenstammes.

Von den Stigmen aus vertheilen sich die Tracheen büschelförmig und verlaufen sich vielfach verästelnd, in immer feineren Röhren zu allen innern Organen des Körpers. — Die grössern Stämme sind durch ihre, wie bronzirte, glänzend hellbraune Färbung schon mit freiem Auge leicht zu erkennen.

Diese Färbung rührt von der Chitinschichte her, welche einen Theil des Tracheengewebes bildet und in spiraligen Windungen das Innere der Röhren auskleidet. Die vordersten Tracheenbüschel haben die längsten und stärksten Stämme, nach hinten zu nehmen sie immer mehr an Länge und Ausdehnung ab.

### Kreislaufsorgane.

Das Gefäßsystem der Lithobien ist wahrscheinlich analog dem der Scolopendriden gebildet. Bei der Kleinheit dieser Thiere und Weichheit des Gefäßstammes, welcher an frischen Thieren alsbald von den sich zusammenrollenden Rückenschildern in die Muskulatur eingehüllt wird und an Weingeistexemplaren überhaupt nicht mehr zu erkennen ist, gelang es mir nie ein genügendes Präparat herzustellen und die Verzweigung des Gefäßstammes zu verfolgen.

Wie Treviranus sah auch ich nur das einfache sogenannte *vas dorsale*. Dieses Rückengefäß ist viel dünner als die Malpigh'schen Gefäße und bei solcher Feinheit in seinen Verzweigungen nicht weiter zu verfolgen. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass das Gefäßsystem der Lithobien mit jenem der Scolopender übereinstimmt, dass nämlich von der Herzkammer aus paarige Zweige nach den Körpersegmenten abgehen und auch der Kopf mit Gefäßen versehen wird.

### Organe der Fortpflanzung.

Die Genitalien befinden sich, wie bei der Ordnung der Chilopoden überhaupt, bei den Lithobien in der hintern Körperhälfte und münden am Ende des Körpers aus.

#### *I. Männliche Geschlechtsorgane.*

Die männlichen Geschlechtsorgane der Lithobien bestehen aus einem mittleren Schlauche, aus zwei seitlichen Gefäßen, zwei seitlichen accessorischen Drüsen, einem Samenbläschen und der Ruthe.

Der mittlere unpaare Schlauch ist der längste Theil des Geschlechtsapparates; er übertrifft, von Samen strotzend, die beiden seitlichen Schläuche bedeutend an Dicke. Er steigt bis über die Mitte der Körperlänge hinauf, schlingt sich dann wie-

der bis zur Hälfte seiner Länge herab und steigt dann wieder über die Höhe seiner ersten Umbiegung hinauf, wo er noch einmal sich hackenförmig umbiegt und in eine feine Spitze blind endet. Seine Wandung ist dick und es lassen sich deutlich dichte Ringfasern an ihr erkennen. In der Abbildung von *Treviranus* (Tab. V. Fig. 7. z.) ist er im Verhältniss zu den seitlichen zu dünn und letztere zu dick dargestellt. Er allein enthält nach meinen Untersuchungen wirkliches Sperma. Dieses besteht in einem dicken zähen Fluidum mit zahlreichen unbeweglichen, verschieden geformten Zellen; ausserdem sind noch zahlreiche Fetttröpfchen in der Samenflüssigkeit enthalten.

Zu beiden Seiten des mittleren Schlauches laufen in unregelmässigen Windungen die seitlichen Gefässe nach vorn, sie sind kürzer und dünner als das mittlere; ihre Wandung lässt keine Ringfasern erkennen. Sie sind durchscheinend und theilweise undurchsichtig milchweiss. Die von *Treviranus* in diesen Gefässen bemerkte *Filaria* ist mir nicht vorgekommen, wohl aber häufig ein anderes Eingeweidethierchen.

Die drei Schläuche münden wahrscheinlich in das Samenbläschen, welches unmittelbar vor der äussern Mündung des Geschlechtsapparates liegt.

Seitwärts von den oben beschriebenen Theilen und diese noch etwas überlagernd, befinden sich zwei Drüsen, über deren Bedeutung noch völliges Dunkel herrscht. Diese drüsigen Organe, von *Treviranus* für Fettmassen, von *Léon Dufour* als Testikeln erklärt, sind von einer sehr feinen Membran umhüllt und enthalten Bläschen mit feinkörnigem Inhalte. Diese Bläschen sind perlschnurförmig aneinandergereiht und liegen in 2—3 kurzen und zwei langen Reihen, welch' letztere die stumpfe Spitze des Organes bilden. Die Ausführungsgänge dieser Drüsen münden wahrscheinlich ebenfalls in die Samenbläschen.

Den Penis bildet ein kurzer, aus weicher, weisslicher Masse bestehender Kegel, welcher rings mit Wimpern besetzt ist und oben eine runde Oeffnung besitzt, die ebenfalls von einem Wimpernkranze umgeben ist. Die Ruthe liegt hinter einem hornigen, in der Mitte gefurchten, an seinem Hinterrande in der Mitte eingekerbten Halbringe. Hinter dieser Einkerbung

tritt bei einem mässigen Druck am lebenden Thiere der Penis hervor.

## II. Weibliche Genitalien.

Nach Wegnahme der Ganglienkeite und des Darmkanals kommen die weiblichen Sexualorgane zum Vorschein. Der Eierstock, in der Mittellinie des Körpers liegend und die Hälfte der Körperlänge überragend, ist ein von einer zarten Membran gebildeter Sack, in welchem meist Eier in allen Entwicklungsstadien enthalten sind.

Das entwickelte Ei ist milchweiss mit durchscheinendem Zellkern. Ein einfaches Ovidukt führt vom Ovarium herab und endet in eine erweiterte Blase, welche Treviranus als uterus (?) bezeichnet.

Auf jeder Seite des Ovarium befinden sich zwei accessoirische, drüsige Organe, von Treviranus für Fettmassen, von Léon Dufour für schmeerabsondernde Drüsen erklärt. Sie sind länglich, spitz und an den Seiten zellig ausgebuchtet. Die beiden innern Drüsen sind breiter als die äussern und durchscheinend, während letztere schmaler sind und einen von rundlichen Bläschen eingeschlossenen, milchweissen, feinkörnigen Inhalt haben. Jede dieser Drüsen hat ihren besondern Ausführungsgang, welcher in die Erweiterung des Ovidukts mündet. Die physiologische Bedeutung dieser Drüsen hat noch keine sichere Erklärung gefunden.

Nach Treviranus liegen zu beiden Seiten des Ovidukt noch zwei längliche Blasen, die aus einer doppelten Haut bestehen, einer äussern, die muskulös zu sein scheint und einer innern, die enger als jene und mit einer zähen, weissen Materie angefüllt ist.

Die äussern weiblichen Geschlechtstheile reihen sich unmittelbar dem letzten Bauchschild an. Ihr Basalglied bildet, wie beim Männchen, ein horniger, in der Mittellinie gefurchter, in der Mitte seines Hinterrandes tief eingekerbter Halbring. Ihm folgen zwei dreieckige, bewegliche Blättchen von denen jedes an seiner freien Spitze ein, zwei oder drei, bei den verschiedenen Arten mannichfach gestaltete Zäpfchen trägt. Diese Zäpfchen sind an ihrer obern Seite rinnig ausgehöhlt und frei

beweglich eingelenkt. Das dritte Glied ist breit, das vierte endet in eine mehr oder weniger gekrümmte, unten rinnig ausgehöhlte Krallen. Diese Endkrallen ist bald fein spitzig bald stumpf, entweder ungetheilt oder einfach gespalten. Bei den meisten Arten sind unterhalb der Spitze dieser Krallen zwei kleine Seitenzähne. Sämmtliche Theile der äussern Geschlechtstheile sind mehr oder minder mit starken Borsten besetzt.

### Nervensystem.

Die Ganglienkette liegt bei den Lithobien unmittelbar über der Muskulatur der Bauchschilde, der Kopftheil derselben über den Fresswerkzeugen, unter dem Oesophagus und in der Kopfspitze.

Der als Gehirn bezeichnete Theil, in seiner Mitte von der Oeffnung für den Durchgang der Speiseröhre durchbohrt, setzt sich nach vorn in zwei rundliche Anschwellungen fort, von welcher zwei breite, kräftige Nervenstränge nach den Fühlern verlaufen, hinter diesen gehen die beiden, die Augen versorgenden Nerven seitlich ab.

Hinter dem Gehirn beginnt die eigentliche Ganglienkette, mit drei Nervenanschwellungen, welche sich unmittelbar aneinander reihen; die erste derselben ist länglich, so lang als die beiden folgenden zusammen, sie liegt noch vollständig unter dem Kopfschilde. Die beiden folgenden sind mehr rundlich; die erste von ihnen liegt zwischen dem hinteren Rande des Kopfes und dem vorderen des ersten Rückenschildes, während die andere in der Mitte des letztern sich befindet.

Die nun folgenden übrigen 13 Ganglien sind durch je zwei Verbindungsstränge (Treviranus gibt deren drei an) vereinigt. Das letzte (18.) Ganglion ist etwas breiter als die übrigen. Die Commissurstränge nehmen an den hinteren Ganglien allmählig an Länge ab; doch ist auch noch das letzte Ganglion mit dem vorhergehenden durch zwei Stränge verbunden. (Treviranus gibt an, dass die beiden letzten Ganglien unmittelbar zusammenhängen.)

Die Ganglien haben eine Mittellängsfurche und liegen in der Querlinie zwischen den Wurzeln der Beinpaare; sie nehmen nach hinten zu an Länge ab und werden mehr rundlich.

Von den Ganglien gehen nach beiden Seiten Nervenstränge in verschiedener Zahl und Stärke ab. Der zu den Beinen gehende Nervenstrang ist immer viel dicker als die andern. Die Verbindungsstränge liegen auf Muskelbündeln, welche bandförmig hinter jedem Ganglion von einer Seite zur andern gehen.

## Sinnesorgane.

### *Schorgane.*

Die Augen der Lithobien sitzen über und an dem Seitenrande des Kopfes an einem ihnen und den Fühlern gemeinschaftlichen Segmente desselben. Es sind zusammengehäufte einfache Augen, an Grösse, Zahl und Stellung bei den einzelnen Arten sehr verschieden. Diese Verschiedenheit bezüglich der Zahl der Augen und der durch Fehlen oder Ueberfluss veränderten Form der Gruppierung erstreckt sich auch auf die Individuen; so wechselt z. B. die Zahl bei *Lith. forficatus* zwischen 36 und 67. Gewöhnlich findet man auf der einen Seite mehr Augen als auf der andern.

Ein grosses Seitenauge, meist grösser als die übrigen, mit einigen derselben manchmal gleichgross, findet sich bei allen Arten. Nur bei *Lithobius aeruginosus* ist das Seitenauge kleiner als die übrigen. Dieses Seitenauge, meist etwas entfernt von den übrigen, steht am weitesten nach hinten und ist gewöhnlich auch von anderer Form.

Die übrigen Augen sind bei den meisten Arten rund, — nur bei einigen Species sind jene der obersten Reihe queroval.

Die Augen sind gewöhnlich in mehr oder minder regelmässige Querreihen gestellt und dann ist die häufigste Form der Gruppierung die eines gleichseitigen Dreiecks, dessen Basis oben, dessen Spitze unten am Kopfrande ist; — die oberste Reihe ist dann die längste, und besitzt die meisten Augen, die übrigen nehmen nach unten an Länge und Zahl ab, z. B. 5, 4, 3, 2.

Bei anderen Arten bilden die Augen ein ungleichseitiges rechtwinkliches Dreieck, von welchem die kurze Kathete dem grossen Seitenauge gegenüber liegt, die längere oben, die Hypothenuse dem Kopfrande entlang läuft; oder sie stellen ein

gleichseitiges Dreieck vor, dessen Spitze oben, dessen Basis am Kopfrande sich befindet.

Ausser diesen Gruppierungen kommt noch vor:

- 1) Die Traubenform,
- 2) neben dem grössern Seitenauge sind 5 oder 6 in einen Kreis gestellt, in dessen Centrum ebenfalls ein Auge sich befindet,
- 3) neben dem grossen Seitenauge stehen 4 in den Ecken eines Vierecks und eines in der Mitte (Quincunx) oder
- 4) alle Augen stehen in einer einfachen Reihe.

### *Antennen.*

Die Fühler der Lithobien, zu beiden Seiten der Kopfspitze dem vordern Ende des Augen-Fühlersegmentes eingefügt, aus dicker Wurzel allmählig gegen die Spitze zu verdünnt, bestehen aus einer Reihe von Gliedern, deren Zahl nach meinen Beobachtungen nie unter 20 herabgeht. Verkümmerbildungen allein machen eine Ausnahme, in diesen Fällen aber zeigt meist der andere Fühler die normale Zahl. Die grösste Fühlergliederzahl hat nach Newport *Lith. longicornis*, nämlich 56—60. Die Fühler sind nach allen Richtungen hin frei beweglich und können beliebig verlängert und verkürzt werden, indem der dünnere Anfang jedes Gliedes in das weitere Ende des vorhergehenden zurückgezogen werden kann. Jedes Glied endet nämlich in eine feingefaltete, weiche Haut, welche sich bei der Verlängerung hervorstülpt und bei der Verkürzung den Anfang des folgenden Gliedes hineinzieht.

Mit Ausnahme Einer Art, (*Lithobius nudicornis*) findet man die Fühler aller bis jetzt bekannter Lithobien mehr oder weniger behaart. Bei dem erwähnten *Lith. nudicornis* steht aber noch in Frage, ob die Behaarung der Fühler nicht, sei es durch den Transport oder auf andere Weise abgerieben wurde. Bei vielen ausländischen Arten meiner Sammlung finde ich daselbe; — jedoch lassen sich bei genauer Untersuchung immer einzelne Härchen entdecken.

Das Endglied der Fühler ist meist konisch und gewöhnlich das längste.

### Bewegungsorgane.

Zur Bewegung des Chitinskelets, d. h. zur gegenseitigen Annäherung und Entfernung seiner einzelnen Theile ist eine kräftige Muskulatur vorhanden, welche besonders in den Fresswerkzeugen, den Bauch- und Rückenschilden stark entwickelt ist.

Zur Fortbewegung des ganzen Körpers dienen 15 Beinpaare, welche den 15 Haupt- und Zwischenschilden entsprechen und in der weichen Seitenhaut zwischen Rücken- und Bauchschilden, unmittelbar über den letztern eingefügt sind. Rings um die Einfügung bildet die weiche Seitenhaut einen wulstigen ovalen Ring, an dessen oberem Ende ein halbmondförmiger horniger Fortsatz als Bewegungsfläche und Stütze für einen entsprechenden kugeligen Fortsatz an der Basis der Hüfte.

Die Beine, seitlich mehr oder weniger zusammengedrückt, nehmen nach hinten an Länge zu; sie bestehen sämmtlich aus 7 Gliedern.

Die beiden ersten Glieder bilden die Hüfte. Das Wurzelglied ist kurz, kaum länger als dick, es stellt auf dem Querschnitt ein Oval vor, und hat in der Mittellinie der Vorderseite eine Längsfurche. Seine untere Hälfte ist länger als die obere, indem letztere die Bewegung des Beines nach oben frei lässt.

Die obere Peripherie der Basis des ersten Hüftengliedes umfassen die beiden Schenkel des oben erwähnten kugeligen Fortsatzes. Das zweite Hüftenglied bildet ein einfacher ovaler Ring, welcher an den hinteren Beinen schräg abgeschnitten ist, so dass er nach unten einen Fortsatz bildet; auf diesem befindet sich an den drei letzten Beinpaaren ein starker Stachel.

Der Oberschenkel ist so lang als die beiden Hüftenglieder zusammen und an seinem Ende oben und unten mit Stacheln besetzt.

Der Unterschenkel, so lang oder etwas länger als der Oberschenkel, nur am ersten Beinpaar kürzer als dieser, ist ebenfalls an seinem obern Ende mit Stacheln besetzt.

Ihm folgen die drei Tarsalglieder, von welchen die beiden ersten viel länger als das dritte sind; letzteres ist kegelförmig und trägt an seiner Spitze die scharfe Endkralle eingelenkt.



Die beiden letzten Tarsalglieder sind ohne Stacheln, während das erste bei den meisten Arten noch solche hat.

Die vier letzten Beinpaare unterscheiden sich von den übrigen noch besonders dadurch, dass das erste Hüftglied unten muldenförmig ausgehöhlt ist und Oeffnungen von verschiedener Gestalt und Anzahl besitzt. Welche Bedeutung denselben beizulegen ist, muss vorläufig noch unentschieden bleiben.

### Lebensweise.

Der Begattungsakt der Lithobien ist noch nicht beobachtet worden; — dagegen habe ich das Eierlegen der Weibchen schon häufig gesehen; sie lassen dieselben einzeln fallen, ohne für ihren Schutz und ihre weitere Entwicklung Vorsorge getroffen zu haben.

Von der Entwicklungsgeschichte der jungen Thiere ist ebenfalls sehr wenig bekannt. Bei noch nicht vollständig entwickelten Thieren sind je nach dem Fortschritte der Entwicklung die letzten zwei, drei oder vier Beinpaare nur als einfache, ungegliederte, der Körperseite eng anliegende kurze Zäpfchen vorhanden; die zu denselben gehörenden Körperschilde sind ebenfalls nur angedeutet und von den äussern Geschlechtstheilen ist noch keine Spur zu bemerken. Erst wenn die Beine vollständig entwickelt sind, kommen die ersten Andeutungen der Sexualorgane zum Vorscheine. Anfänglich ist der Basaltheil derselben nur ein einfacher schmaler Halbring ohne Furchung und Einkerbung, die übrigen Glieder bilden einen einfachen Kegel ohne bemerkbare Gliederung. Bei späteren Umbildungen ist der Basaltheil zwar vollständig entwickelt, jedoch weich und kahl, die übrigen Glieder sind in Form eines bereits mit Andeutung der Gliederung versehenen Kegels vorhanden, von den Zäpfchen am 2. Gliede oder einer Endkralle nichts zu bemerken. Erst das Vorhandensein der Zäpfchen und der Endkralle, welche gleichzeitig in der letzten Entwicklungsperiode erscheinen, zeigt die Geschlechtsreife des Thieres an.

Erst jene Thiere können als vollständig entwickelte gelten, bei welchen sowohl der äussere Geschlechtsapparat als die letzten vier Beinpaare vollständig gebildet erscheinen. Es ist für die Entscheidung der Feststellung neuer Arten nothwendig

hierauf ganz besonders zu merken, wenigstens bei den Weibchen, — leider kennt man bei den Männchen kein Zeichen ihrer Geschlechtsreife.

Die Lithobien häuten sich und nach jeder Häutung gewinnt der Körper an Grösse. Die Häutung geht noch über das Stadium der vollständigen Entwicklung des Thieres hinaus, so dass auch diese noch wachsen, — daher die Verschiedenheit der Grösse bei entwickelten Thieren, so z. B. bei *L. forficatus*, welcher in einer Grösse von 9 — 11''' gefunden wird. — Der Häutungsvorgang selbst ist folgender: Das Thier krallt sich mit dem letzten Beinpaare in einen festen Gegenstand ein, — das Segment der Kopfspitze öffnet sich, ebenso trennt sich das Augen-Fühlersegment ab. Während der Kopf vorrückt, zieht das Thier die Fühler aus ihrer alten Hülle heraus, diese legen sich seitlich an den Körper an. Bei dem Durchtritt des Kopfes durch die entstandene Oeffnung, bleibt das Segment der Kopfspitze, das Augen-Fühlersegment sowie die ganze untere Parthie des Kopfes unten. Die Beine sind beim Durchtritt durch die Kopföffnung nach hinten an die Körperseiten angedrückt und gewinnen erst nach und nach ihre Beweglichkeit wieder. Unter wurmförmigen Bewegungen schlüpft das Thier aus seiner alten Hülle hervor; das Geschäft scheint die mithelfenden Kräfte der noch weichen neuen Theile in hohem Grade anzustrengen, denn das Thier lässt jedesmal, nachdem eine kleine Parthie sich herausentwickelt hat, eine längere Pause zum Ausruhen eintreten. Der ganze Akt währt immer länger als eine Stunde. Das neugehäutete Thier ist in allen seinen Theilen weich, von weisser Farbe, durch welche die violette Färbung der innern Theile durchscheint; nur die krallenartigen Endtheile der Beine, Kinnladen und Lippentaster, sowie die Zähne der Unterlippe zeigen bereits die braune Farbe des Chitins; erst nach einigen Tagen hat das Thier vollständig seine ursprüngliche Färbung wieder. Das zurückbleibende Chitinskelet ist enge zusammengeschoben; bei einem *Lith. forficatus*, der eine Länge von 11''' besass, war es auf 4''' zusammengedrängt. Während der Häutung schwitzt das Thier eine schmierige Flüssigkeit aus, welche wahrscheinlich das Herausschlupfen befördern soll; sie ist ziemlich reichlich vorhanden und es bleibt immer ein Theil

in der abgestreiften Hülle zurück. Bei einem der Thiere, an welchen ich den Häutungs Vorgang beobachtete, waren die beiden letzten Glieder des einen Schleppbeines abgebrochen, — nach der Häutung waren dieselben, jedoch etwas verkürzt, vollständig, auch mit der Endkralle, regenerirt.

Die Lithobien leben von animalischer Nahrung, nämlich, so weit ich sie beobachtete, von Insekten. Die Gärtner in dem Wahne, dass diese Thiere die feinen Pflänzchen und Würzelchen fressen, verfolgen und tödten die nützlichsten Bewohner ihrer Tröge. Ich habe sie in der Gefangenschaft mit Mücken gefüttert, jedoch auch oft gesehen, dass die grössern Arten die kleinern ihres eigenen Genus verzehren.

Im Fangen der Mücken sind sie sehr behende, sie packen dieselben mit den Vorderbeinen und beißen ihre Beute mit den Zangen des Lippentaster. Ihr Biss tödtet bei weitem nicht so schnell wie jener der Spinnen, wahrscheinlich tödtet der Biss nur als solcher in Verbindung mit starkem Zusammenpressen der Beute durch die Lippentaster. Die Fresszangen besitzen keine Giftritze; möglich wäre, dass das Eindringen von giftigem Speichel aus der Mundhöhle in die durch den Biss verursachte Wunde die Beute tödtet.

Die Lithobien verzehren ihre Beute, sie saugen sie nicht bloß aus; die Unterlippe macht dabei nagende Bewegungen ab und auf, vor- und rückwärts, während die Beute mit den Lippentastern festgehalten wird. Die abgebissenen Theile werden von den Krallen der Kinnladentaster ergriffen und in die Mundöffnung geführt. Sind mehrere Lithobien in einem Glase beisammen, so suchen sie sich einander die Beute abzu jagen. Während das Thier noch an der ersten Mücke zu zehren hat, sucht es bereits eine andere zu erhaschen und hält sie dann mit den Beinen fest, bis es die erste verzehrt hat. Sie lassen gewöhnlich nur die Flügel und Beine der Mücken übrig. Binnen einer Stunde verzehrte ein *Lithobius forficatus* drei gewöhnliche Stubenfliegen; besonders wohl zu schmecken scheinen ihnen die Eier der Mücken, welche sie nach geöffnetem Hinterleib eines nach dem andern mit den Kinnladentastern hervorziehen und verschlingen.

Die Lithobien bewegen sich ausserordentlich rasch, scheinen

aber nur bei Nacht ihre Ruheplätze zu verlassen und ihrer Beute nachzugehen. In der Ruhe strecken sie die Beine aus und legen die Fühler gerade vor. Wenn beim Graben ihrer Gänge Sand oder Erde an den Fühlern oder Beinen hängen bleibt, reinigen sie dieselben sehr sorgfältig, sie fangen dabei mit den Fühlern an, welche sie von der Wurzel bis zur Spitze durch die Lippentaster ziehen, dann nehmen sie Bein für Bein in gleicher Weise vor, bis sie vollständig gereinigt sind. Wenn sie sich in die Erde wühlen, legen sie die Fühler rückwärts und bohren mit dem Kopfe voran, während sie die aufgewühlte Erde mit den Beinen zurückwerfen. Wenn eines das andere im Fressen in der Ruhe oder sonst stört, raufen sie förmlich mit einander.

Am besten lässt sich ihre Lebensweise in einem mit feingesiebter feuchter Gartenerde gefülltem Glase beobachten.

Die Lithobien leben in Wäldern, im Moose und unter Steinen, in Gärten am liebsten in Trögen und Dungstätten, selten unter Brettern und Steinen. Sie ziehen feuchte Stellen vor, doch fand ich sie auch an ganz trocknen südlichen Abhängen; in der Gefangenschaft wollen sie aber immer feucht gehalten sein und sterben im Trocknen sehr bald. Gewisse Arten scheinen ausschliesslich nur bestimmten geologischen Gebieten anzugehören, — doch kann ich mich hierüber nicht mit Gewissheit aussprechen, weil meine eignen Beobachtungen auf den kleinen Umkreis der nähern Umgebung meines Wohnorts beschränkt blieben.

Ihre geographische Verbreitung betreffend, sind Arten aus Europa, Nordafrika, Amerika, Ostindien und Australien bekannt.

Es erscheint nothwendig, zur Würdigung des Werthes der als Merkmale bei Aufstellung der Arten in Betracht genommenen Körpertheile einige Bemerkungen vor auszuschicken:

1) Die Kopfform ist immer ein constantes Merkmal, doch ist sie für keine Art ein ausschliessliches Kennzeichen, ebenso wenig die Furchenlinie der Kopfspitze, resp. das Eingedrücktsein derselben in ihrer Mitte und die Punktirung des Kopfschildes.

2) Die Fühler. Die Zahl der Glieder, obwohl bei vielen Arten sehr wechselnd, gibt, wenn sie bei einer grössern Zahl

von Individuen ständig ist, immerhin einen Anhaltspunkt; bei einigen Arten ist jedoch die Zahl der Fühlerglieder sehr constant. Die Behaarung der Fühler ist von geringer Bedeutung und kann, namentlich bei weit her transportirten Exemplaren ganz abgerieben sein. Die Länge der Fühler kann nie bestimmt angegeben werden, weil das Thier sie willkürlich verkürzen und verlängern kann.

3) Die Zahl der Augen und ihre Gruppierung ist, wenn auch oft variabel, doch eines der wichtigsten Merkmale.

4) Von den Fresswerkzeugen ist hauptsächlich die Unterlippe von grossem Werthe für die Artenbestimmung. Ihre Wölbung, Punktirung, Bildung des Zahnrandes, endlich und hauptsächlich die Zahl, Stellung und Form der Zähne selbst müssen immer in Betracht gezogen werden. Die Zahl der Zähne ist nur bei wenigen Arten unbeständig.

5) Die Rückenschilde selbst können Merkmale des Artenunterschiedes bieten:

a) durch das Vorhandensein oder Fehlen der Zahnfortsätze an den Haupt- und Zwischenschilden;

b) durch die Punktirung, Runzelung, Glätte oder Granulation;

c) durch ihre mehr oder minder starke Wölbung.

6) Die vier letzten Beinpaare. Die Zahl, Form und Anordnung der Hüftlöcher ist eines der wichtigeren Kennzeichen; die Länge und Dicke des letzten Beinpaares, das Verhältniss der Länge der einzelnen Glieder, besonders auch die Zahl der Stacheln am untern Theile der Gelenkspitzen, sowie das Vorhandensein oder Fehlen von Furchenlinien sind von grosser Bedeutung für den Artenunterschied.

7) Nicht minder wichtig ist die Bildung der äussern weiblichen Genitalien, die Zahl und Form der Zapfchen am zweiten Gliede derselben und die Form der Endkralle.

8) Die Färbung der Thiere ist für die Artenbestimmung völlig werthlos.

# Analytische Tabelle zur leichteren Bestimmung der Arten.

## I. Abtheilung.

### Arten mit Zahnfortsätzen an bestimmten Rückenschilden.

1.	{ Zehn und mehr Zähne an der Unterlippe . . . . .	2.
	{ Weniger als zehn Zähne an der Unterlippe . . . . .	13.
2.	{ Am 4. Hauptschilde Zahnfortsätze . . . . .	3.
	{ Am 4. Hauptschilde keine Zahnfortsätze, sondern nur an den drei hintern Zwischenschilden . . . . .	8.
3.	{ Am 4. Hauptschilde und den drei hintern Zwischenschilden Zahnfortsätze . . . . .	4.
	{ Am 4. Hauptschilde und den vier hintern Zwischenschilden Zahnfortsätze . . . . .	5.
4.	{ Das 6. und 7. Glied der Schleppbeine innen mit deutlicher Längsfurche . . . . .	L. transmarinus.
	{ Das 6. und 7. Glied der Schleppbeine ohne Längsfurche . . . . .	L. mordax.
5.	{ Das vorletzte Beinpaar dicker als das letzte . . . . .	L. grossipes.
	{ Das vorletzte Beinpaar nicht dicker als das letzte . . . . .	6.

- |     |                                                                              |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6.  | { Augen der obern Reihe rund . . . . .                                       | L. festivus.    |
|     | { Augen der obern Reihe queroval . . . . .                                   | 7.              |
|     | { Die Zähne der Unterlippe gleich weit von einander entfernt . . . . .       | L. montanus.    |
| 7.  | { Die Zähne der Unterlippe nicht gleich weit von einander entfernt . . . . . | L. punctulatus. |
| 8.  | { Hüftlöcher rund . . . . .                                                  | 9.              |
|     | { Hüftlöcher länglich . . . . .                                              | 11.             |
|     | { Die Hüftlöcher in einfacher Reihe . . . . .                                | 10.             |
| 9.  | { Die Hüftlöcher in mehrfachen Reihen und ohne Ordnung . . . . .             | L. impressus.   |
|     | { Zahnfortsätze stumpf, der Innenrand derselben aufgeworfen . . . . .        | L. muscorum.    |
| 10. | { Zahnfortsätze spitz, der Innenrand derselben nicht aufgeworfen . . . . .   | L. hortensis.   |
|     | { Keine Furchenlinien auf den Schleppbeinen . . . . .                        | L. forficatus.  |
| 11. | { Furchenlinien auf den Schleppbeinen . . . . .                              | 12.             |
|     | { Auf dem 4. Gliede der Schleppbeine eine muldenartige Furche . . . . .      | L. parisiensis. |
| 12. | { Auf dem 4. Gliede der Schleppbeine eine einfache Furchenlinie . . . . .    | L. trilineatus. |
|     | { Acht Zähne an der Unterlippe . . . . .                                     | 14.             |
| 13. | { Vier Zähne an der Unterlippe . . . . .                                     | 17.             |
|     | { Mehr als 50 Fühlerglieder . . . . .                                        | L. piceus.      |
| 14. | { Weniger als 50 Fühlerglieder . . . . .                                     | 15.             |
|     | { Am fünften Gliede der Schleppbeine unten kein Stachel . . . . .            | L. sordidus.    |
| 15. | { Am fünften Gliede der Schleppbeine unten zwei Stacheln . . . . .           | 16.             |
|     | { An keiner Hüfte mehr als 3 Löcher . . . . .                                | L. coriaceus.   |
| 16. | { An keiner Hüfte unter 4 Löcher . . . . .                                   | L. fossor.      |
|     | { Am Ende des dritten Schleppbein-gliedes unten nur ein Stachel . . . . .    | 18.             |
| 17. | { Am Ende des dritten Schleppbein-gliedes unten drei Stacheln . . . . .      | 19.             |

- |     |   |                                          |                    |
|-----|---|------------------------------------------|--------------------|
| 18. | { | Am fünften Gliede der Schleppbeine       |                    |
|     |   | unten nur ein Stachel . . . . .          | L. immutabilis.    |
|     | { | Am fünften Gliede der Schleppbeine       |                    |
|     |   | unten kein Stachel . . . . .             | L. minimus.        |
| 19. | { | Am fünften Gliede der Schleppbeine       |                    |
|     |   | unten zwei Stacheln . . . . .            | L. dentatus.       |
|     | { | Am fünften Gliede der Schleppbeine       |                    |
|     |   | unten keine Stacheln . . . . .           | 20.                |
| 20. | { | Am dritten und vierten Gliede der        |                    |
|     |   | Schleppbeine unten 3 Stacheln . . . . .  | 21.                |
|     | { | Am vierten Gliede der Schleppbeine       |                    |
|     |   | unten zwei Stacheln . . . . .            | 22.                |
| 21. | { | Die Rückenschilde mit spitzen Zahn-      |                    |
|     |   | fortsätzen . . . . .                     | L. bucculentus.    |
|     | { | Die Rückenschilde mit stumpfen Zahn-     |                    |
|     |   | fortsätzen . . . . .                     | L. melanocephalus. |
| 22. | { | Die Rückenschilde runzelig . . . . .     | 23.                |
|     |   | Die Rückenschilde glatt oder nur         |                    |
|     |   | wenig uneben . . . . .                   | 24.                |
| 23. | { | Die Runzeln der Rückenschilde in         |                    |
|     |   | deutlich bemerkbarer Anordnung . . . . . | L. agilis.         |
|     | { | Die Runzeln der Rückenschilde un-        |                    |
|     |   | geordnet . . . . .                       | L. macilentus.     |
| 24. | { | Der Innenrand der Zahnfortsätze breit    |                    |
|     |   | aufgeworfen . . . . .                    | L. venator.        |
|     | { | Der Innenrand der Zahnfortsätze kaum     |                    |
|     |   | bemerkbar aufgeworfen . . . . .          | L. velox.          |

## II. Abtheilung.

### Arten ohne Zahnfortsätze an den Rückenschilden.

- |    |   |                                        |             |
|----|---|----------------------------------------|-------------|
| 1. | { | Hüftlöcher oval . . . . .              | 2.          |
|    |   | Hüftlöcher rund . . . . .              | 4.          |
| 2. | { | Acht Zähne an der Unterlippe . . . . . | L. inermis. |
|    |   | Vier Zähne an der Unterlippe . . . . . | 3.          |



- |     |   |                                                                                                 |                        |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.  | { | Fühler langgliedrig . . . . .                                                                   | <i>L. granulatus.</i>  |
|     | { | Fühler kurzgliedrig . . . . .                                                                   | <i>L. alpinus.</i>     |
| 4.  | { | Fühler nicht über 22 Glieder . . .                                                              | 5.                     |
|     | { | Fühler mehr als 22 Glieder . . .                                                                | 8.                     |
| 5.  | { | Schleppbeine beim Männchen mit einem Auswuchs . . . . .                                         | <i>L. curtipes.</i>    |
|     | { | Schleppbeine beim Männchen ohne Auswuchs . . . . .                                              | 6.                     |
| 6.  | { | Die Hauptschilde mit einer Längsfurche                                                          | <i>L. sulcatus.</i>    |
|     | { | Die Hauptschilde ohne Längsfurche                                                               | 7.                     |
| 7.  | { | Die Augen in einer Reihe . . .                                                                  | <i>L. aeruginosus.</i> |
|     | { | Die Augen in drei Reihen . . .                                                                  | <i>L. crassipes.</i>   |
| 8.  | { | Die Schleppbeine beim Männchen mit einem Auswuchs, beim Weibchen die Endkrallen zweispitzig     | <i>L. calcaratus.</i>  |
|     | { | Die Schleppbeine beim Männchen ohne Auswuchs, die Endkrallen beim Weibchen dreispitzig . .      | 9.                     |
| 9.  | { | Die innern Zäpfchen am zweiten Gliede der Genitalien des Weibchens gegeneinander gekrümmt       | 10.                    |
|     | { | Die innern Zäpfchen am zweiten Gliede der Genitalien des Weibchens nicht gegeneinander gekrümmt | 12.                    |
| 10. | { | Die Schleppbeine beim Männchen mit einer Furche . . . . .                                       | <i>L. mutabilis.</i>   |
|     | { | Die Schleppbeine beim Männchen ohne Furche . . . . .                                            | 11.                    |
| 11. | { | Der Kopf länglich . . . . .                                                                     | <i>L. communis.</i>    |
|     | { | Der Kopf herzförmig . . . . .                                                                   | <i>L. cinnamomeus.</i> |
| 12. | { | Drei Stacheln unten am Ende des 3. und 4. Gliedes, ein Stachel am 5. . . . .                    | 13.                    |
|     | { | Ein Stachel unten am Ende des dritten und vierten Gliedes, keiner am 5. . . . .                 | 16.                    |

13. { Nur vier Augen auf jeder Seite . . . L. carinatus.  
 { Augen zahlreich . . . . . 14.
14. { Fühler nicht über 33 Glieder . . . L. erythrocephalus.  
 { Fühler nicht unter 36 Glieder . . . 15.
15. { Der Kopf rundlich . . . . . L. muticus.  
 { Der Kopf breit herzförmig . . . L. lucifugus.
16. { Fühler kurz . . . . . L. lubricus.  
 { Fühler lang . . . . . L. minutus.
-

## **I. Abtheilung. Arten mit Zahnfortsätzen an bestimmten Rückenschilden.**

### **I. Unterabtheilung. Arten mit Zahnfort- sätzen an Haupt- und Zwischen- schilden.**

#### **A. Arten mit zahlreichen nicht in bestimmten Reihen geordneten Hüftlöchern.**

*Lithobius montanus. F. Koch.*

Zähne der Unterlippe: 14.

Zahl der Fühlerglieder: 53 (nach F. Koch 47).

Hüftlöcher zahlreich, ohne bestimmte Ordnung; Form der  
Hüftlöcher rund.

Körperlänge: 17'''.

Augenstellung: Tab. I. 1. \*)

Forstr. Koch, System der Myr. S. 148.

Glänzend, wenig gewölbt.

Kopf herzförmig, ziemlich glatt und flach, weitschichtig  
grob eingestochen punktirt; Furchenlinie der Kopfspitze sehr  
deutlich, in der Mitte nicht eingedrückt. Die Fühler sehr lang,  
das zweite Glied von ungewöhnlicher Länge, die letzten 14  
Glieder verlängert. Gliederzahl 53, — alle Glieder mit sehr  
kurzen Borsten rings besetzt. — Unterlippe mehr als  $\frac{1}{3}$  breiter  
als lang, sehr gewölbt, zerstreut eingestochen punktirt, stark  
glänzend, Zahnrand aufgeworfen, breit, fast gerade, in der

\*) Mit Uebergang der fast zahllosen Abweichungen wurde nur die  
am häufigsten bei einer Art vorkommende Augenstellung abgebildet.

Mitte eingekerbt, mit 7 kurzen, gleich weit von einander entfernten Zähnen beiderseits. Lippentaster sehr glänzend, deutlich zerstreut eingestochen punktirt; Zangen lang, mässig gebogen.

Seitenauge oval, die übrigen Augen in vier wenig gebogenen Reihen; die beiden obern Reihen mit je vier, die **untern mit je fünf Augen**. Die drei hintern Augen der obersten Reihe sehr gross, queroval.

Die Rückenschilde etwas uneben runzelig, vom 4. beginnend die Oberfläche, besonders des vor- und drittletzten, körnig, **→ die Zwischenschilde ohne derartige Körner.** — Der 4. Haupt- und die vier hintern Zwischenschilde mit **langen Zahnfortsätzen**. Die Beine sehr lang, besonders die Schleppebeine, diese viel länger als die Hälfte des Körpers. — Das vorletzte Beinpaar nicht so dick als das letzte, am dritten Gliede der beiden letzten Beinpaare oben zwei Längsfurchen, am 4. und 5. je eine an der Aussenseite, am 4. auch unten eine Längsfurche. — Die Schleppebeine unten sehr dicht fein eingestochen punktirt, glatt, fast haarlos, nur am Ende des 7. Gliedes unten einzelne angedrückte starke Borsten. An der Spitze des dritten Gliedes unten drei wenig gekrümmte Stacheln, ein langer mittlerer und zwei seitliche kürzere, am 4. nur zwei, indem hier der innere kürzere fehlt; ein längerer Stachel am 5. Gliede. Das 4., 5. und 6. Glied der Schleppebeine fast gleich lang, das 3. etwas kürzer. Das dritte unten fast schneidig scharf, innen stark ausgehöhlt, die übrigen fast walzlich, seitlich nur wenig zusammengedrückt. Hüftlöcher rund, zahlreich, ohne bestimmte Ordnung. Bauchschilde sehr glänzend, weitschichtig eingestochen punktirt.

Die vordern sechs Hauptschilde mit ihren Zwischenschilden und die Beine mit Ausnahme der beiden letzten Paare bräunlichgelb, die letzten drei Hauptschilde mit ihren Zwischenschilden dunkelbraunroth, — der Kopf, die Fühler und die beiden letzten Beinpaare braunroth, die vordern Bauchschilde bräunlichgelb, die letzten mehr rothbraun.

Scheint im südlichen Tirol auf höhern Bergen keine Seltenheit. — Durch Herrn Prof. P. Gredler in Botzen von der Seiseralpe erhalten.

### Lithobius festivus.

Zähne der Unterlippe: 14.

Zahl der Fühlerglieder: 46—47.

Hüftlöcher zahlreich, ohne bestimmte Ordnung.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 13''' (Weibchen), 11''' (Männchen).

Augenstellung: Tab. I. 2.

Mattglänzend, vorn flach, hinten mehr gewölbt.

Kopf breit herzförmig, oben flach, in den Seiten stärker hervorgewölbt, uneben, weitschichtig grob eingestochen punktirt, Furche der Kopfspitze deutlich, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler mässig lang, das zweite Glied etwas verlängert, doch nicht so auffallend wie bei *montanus*, — alle Glieder kurzborstig dicht behaart. Gliederzahl 46 oder 47.

Unterlippe sehr breit und kurz, mässig gewölbt, sehr weitschichtig grob eingestochen punktirt, Zahnrand aufgeworfen, fast gerade, in der Mitte nur wenig eingekerbt, beiderseits 7 kurze, stumpfe, gleich weit von einander entfernte Zähne, Lippentaster ohne eingestochene Punkte, Zangen derselben nicht sehr kräftig.

Augen in vier etwas gebogenen Reihen, 4, 4, 5, 3 beim Weibchen, 4, 4, 3, 2 beim Männchen, — die Augen der obern Reihe sämtlich rund, viel grösser als die der übrigen; das Seitenauge sehr gross, spitzeiförmig.

Die Rückenschilde runzelig uneben, die 6 hintern Hauptschilde mit zerstreuten Körnchen, die Zwischenschilde ohne solche. Der 4. Haupt- und die vier hintern Zwischenschilde mit grossen Zahnfortsätzen, deren Innenrand nicht aufgeworfen ist.

Die Beine sehr lang, die Schleppebeine viel länger als die Hälfte des Körpers ( $8\frac{1}{2}$ '''). Das vorletzte Beinpaar bei beiden Geschlechtern nicht so dick als das letzte, — auf dem 3. und 4. Gliede oben zwei parallele Längsfurchen, auf dem fünften eine solche an der Aussenseite. Dieselben Furchen auch am Endpaare, nur hat bei diesem das 4. Glied auch unten eine Längsfurche. Von den Gliedern des Endpaares sind das 4. und 5. fast gleich lang, ebenso die beiden folgenden, diese aber länger, das dritte merklich kürzer. Das dritte unten fast schneidig scharf, die übrigen beinahe walzlich, seitlich nur wenig

zusammengedrückt. Drei gerade Stacheln, nämlich ein langer mittlerer und zwei seitliche kürzere unten am Ende des dritten Gliedes, zwei am vierten (hier fehlt nämlich der innere kürzere), einer am 5. Gliede. Alle Glieder der Schleppebeine unten dicht sehr fein eingestochen punktirt. — Die Hüftlöcher rund, zahlreich, ohne bestimmte Ordnung. — Die Bauchschilde glänzender als die Rückenschilde; weitschichtig grob eingestochen punktirt.

Weibchen: Von den zwei konischen Zäpfchen am zweiten Gliede der Genitalien das innere kürzer, die Endkrallen stark gekrümmt, einfach, weder gegabelt noch mit Seitenzähnen.

Das Männchen kleiner.

Der Kopf bräunlichgelb, die Kopfspitze, die Umgebung der Augen und die Seitenränder dunkelbraun, ein Längsfleck von derselben Farbe in der Mitte, auch am Hinterrande kleine dunkle Flecken. Die Rückenschilde bräunlichgelb, auf den Hauptschilden ein dunkelbrauner Pfeilfleck in der Mitte, beiderseits desselben vorne zwei braune Längsfleckchen, die Seiten- und Hinterränder der Hauptschilde breit braun gesäumt, der letzte Rückenschild einfarbig dunkelrothbraun. Die Fühler röthlichgelb, ebenso die beiden letzten Beinpaare und die hintern Bauchschilde. Die Unterlippe, die vordern Bauchschilde und die Beine gelb, letztere mit schwarzbraunen Krallen; die Stacheln an den Beinen gelb mit schwarzen Spitzen. Die Lippentaster gelb mit rothbraunen Zangen.

Bei Garmisch im bayerischen Hochgebirge. (Sammlung des Herrn Grafen Keyserling in München.)

---

### *Lithobius punctulatus.* F. Koch.

Zähne der Unterlippe: 14 — 16.

Zahl der Fühlerglieder: 42.

Hüftlöcher: zahlreich, ohne bestimmte Ordnung.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 12'''.

Augenstellung: Tab. I. 3.

Forstr. Koch, Syst. d. Myr. S. 147.

Die drei Exemplare dieser Art, welche ich besitze, sind leider sämtlich in sehr defectem Zustande.

Gewölbt, glänzend.

Der Kopf so lang als breit, wenig gewölbt, mit breiter, flacher Randeinfassung, die ganze Kopffläche, besonders die Spitze, zerstreut grob eingestochen punktirt, dazwischen grössere runde Grübchen; die Furchenlinie der Kopfspitze in der Mitte eingedrückt. Unterlippe gewölbt, breiter als lang, mit tiefer Mittelfurche, ziemlich dicht grob eingestochen punktirt, der Zahnrand in der Mitte wenig eingekerbt, nur wenig gekrümmt, beiderseits der Mittelkerbe 7 oder 8 kurze stumpfe Zähnnchen, von denen die 4 äussern entfernter stehen, als die innern. Lippen-taster sehr entwickelt, mit stark gekrümmten Zangen, zerstreut eingestochen punktirt.

Fühler länger als die Körperhälfte, dicht kurz behaart, mit 42 Gliedern. Augen in 4 Reihen entweder 4, 4, 5, 3 oder 4, 4, 4, 2, die der obern Reihe, besonders das erste derselben, grösser und queroval, das Seitenauge oval, schräg gestellt.

Die Rückenschilde gewölbt, der 4. Haupt- und die vier hintern Zwischenschilde mit kurzen breiten Zahnfortsätzen, nur die des hintersten Zwischenschildes etwas länger und spitzer. Die Fläche der Rückenschilde uneben, — um die Hinterandswinkel des 5., 6. und 7. Hauptschildes etwas körnig.

Beine fehlen bei meinen Exemplaren. Nach den Beschreibungen von Forstrath Koch haben die 3. und 4. Glieder der vier Hinterbeinpaare oben zwei Längsfurchen und einen Längskiel zwischen diesen. Die Hüflöcher rund, zahlreich, nicht in bestimmte Reihen geordnet.

Sämtliche Bauchschilde deutlich dicht fein eingestochen punktirt.

Von den zwei sehr starken und spitzen Zäpfchen am 2. Gliede der weiblichen Genitalien das äussere länger als das innere, die Endkrallen einfach, ohne Seitenzähnnchen.

Rostroh, die Bauchschilde etwas heller.

Vorkommen: Dalmatien und Griechenland.

*Lithobius grossipes. F. Koch.*

Zähne der Unterlippe: 16.

Zahl der Fühlerglieder: 46.

Hüftlöcher: zahlreich, ohne bestimmte Ordnung.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 15'''.

Augenstellung: Tab. I. 4.

Forstr. Koch, System der Myr. S. 146.

Glänzend, flach.

Kopf breiter als lang, in den Seiten gerundet, Hinterrand fast gerade, die Kopffläche uneben, eingestochen punktirt, Furchenlinie der Kopfspitze deutlich, in der Mitte nicht eingedrückt, Randeinfassung nieder und breit.

Die Fühler mit 46 dicht kurzborstigen Gliedern.

Unterlippe breit, stark gewölbt, ohne eingestochene Punkte, Zahnrand gerade und breit, mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits derselben acht kurze, stumpfe Zähne, von denen die äussern vier etwas entfernter stehen als die innern.

Seitenauge gross, oval, schräggestellt, die übrigen Augen in vier geraden Reihen mit je drei Augen, von denen die der obersten Reihe sehr gross und queroval sind und ziemlich weit von einander entfernt stehen.

Die Rückenschilder flach, in den Seiten stark runzelig uneben, der 4. Haupt- und die vier hintern Zwischenschilder an den Hinterrandsecken mit grossen Zahnfortsätzen, deren Innenrand nicht aufgeworfen ist.

Die Beine sehr lang, das 3., 4. und 5. Glied des vorletzten Beinpaars auffallend dicker, als die betreffenden Glieder des letzten.

Länge der Schleppebeine  $7\frac{1}{4}$ ''' , das 3. und 4. Glied fast gleichlang, etwas kürzer als die ebenfalls gleichlangen 5. und 6. Das 3. Glied innen ausgehöhlt, seitlich zusammengedrückt, gegen das Ende keulig verdickt; das 4. und die übrigen fast walzlich. — Das 3. und 4. Glied der beiden letzten Beinpaare oben mit zwei parallelen Furchenstrichen, das 5. mit einem an der Aussenseite. Drei gerade Stacheln (ein langer mittlerer und zwei kürzere seitliche) am 3. Gliede, zwei am 4. (hier



fehlt der innere kürzere), einer am 5. Gliede. Hüftlöcher rund, zahlreich, ohne bestimmte Ordnung.

Bauchschilde glänzend, auf den vordern zwei, auf den hintern drei etwas undeutliche Längseindrücke.

Die Zäpfchen am zweiten Gliede der weiblichen Genitalien spitz konisch, die Endkrallen stark gekrümmt, ungetheilt.

Ich besitze nur ein abgebliches aufgestecktes Exemplar, an dem die Färbung kaum mehr zu erkennen ist; da dieselbe überhaupt zur Kenntniss der Arten bei den Lithobien nichts beiträgt, kann die Beschreibung derselben ganz wegbleiben.

Vaterland: Idria.

## B. Arten mit einer einfachen Reihe ovaler Hüftlöcher.

### Lithobius transmarinus.

Zähne der Unterlippe: 12.

Zahl der Fühlerglieder: 38.

Zahl der Hüftlöcher: 5, 8, 7, 5 oder 6, 8, 7, 5,

Form der Hüftlöcher: oval.

Körperlänge:  $7\frac{1}{4}$ '''.

Augenstellung: Tab. I. 5.

Sehr gewölbt, glänzend.

Kopf auffallend länger als breit, gewölbt, mit flacher Randeinfassung, die Kopffläche uneben, mit vereinzelt, grob eingestochenen Punkten; hinter der sehr feinen Furchenlinie der Kopfspitze zwei runde Grübchen. Die Fühler lang, mit 38 Gliedern; Behaarung abgerieben (jedoch so viel sich noch erkennen lässt, ziemlich langborstig), das Endglied fast eiförmig.

Die Augen in fünf gebogenen Reihen, dicht gedrängt 7, 7, 5, 7, 5. Das Seitenauge oval, nahe an den übrigen. Die Unterlippe sehr glänzend, wenig gewölbt, der Zahnrand schmal, zu beiden Seiten der tiefen Mittelkerbe gebogen, beiderseits 6 kurze, stumpfe Zähne, wovon die äussern entfernter stehen. Die Unterlippe sowie die Lippentaster weitschichtig grob eingestochen punktirt.

Die Rückenschilde gewölbt, in den Seiten etwas

runzelig, der 4. Hauptschild mit einem Zahnfortsatze, dessen Innenrand aufgeworfen, auch die drei letzten Zwischenschilde mit Zahnfortsätzen, deren Innenrand jedoch nicht aufgeworfen. Das 4., 5. und 6. Glied der Schleppbeine gleich lang, das 3. kürzer, alle Glieder seitlich zusammengedrückt, das 4—7. dicht fein eingestochen punktirt; am 3. und 4. drei Stacheln (ein mittlerer länger und zwei seitliche kürzere) am 5. nur der mittlere und der äussere; das 3. und 4. Glied unten mit einer Längsfurche, — an der Innenseite des 6. und 7. eine tiefe Längsrinne.

Die Hüftlöcher oval, am hintersten Beinpaar 5 oder 6, am vorletzten 8, am drittletzten 7, am vordersten 5.

Am zweiten Gliede der weiblichen Genitalien die Zäpfchen lang und spitz; die Endkrallen stumpf mit zwei ebenfalls stumpfen kurzen Seitenzähnen.

Die Bauchschilder glänzend.

Bräunlichgelb, der Kopf, die Fühler, Unterlippe und Lippentaster röthlichbraun, letztere mit schwarzer Zangenspitze. Beine bräunlichgelb.

Vaterland: Neworleans. (Sammlung des Herrn Grafen Keyserling.)

### **Lithobius mordax.**

Zähne der Unterlippe: 12—14.

Zahl der Fühlerglieder: ?

Zahl der Hüftlöcher: 6, 8, 8, 9.

Form der Hüftlöcher: länglich.

Körperlänge: 14'''.

Augenstellung: Tab. I. 6.

Mattglänzend, vorne ziemlich flach, hinten mehr gewölbt.

Kopf breiter als lang, kahl, etwas uneben, mit schmaler Randeinfassung, — überall, besonders aber die vordere Kopfhälfte sehr grob eingestochen punktirt. Die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Fühler langgliedrig, Glieder über 36 (abgebrochen, auch die Behaarung abgerieben und nur an einzelnen Stellen, besonders am Ende der Glieder noch zu bemerken).

Unterlippe gewölbt, mit tiefer Mittelrinne, an der Basis sehr breit, weitschichtig grob eingestochen punktirt. Zahnrand mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits derselben gebogen, mit 6—7 sehr langen und kräftigen Zähnen, von denen die äussern weiter von einander entfernt, als die inneren; die Lippentaster grob eingestochen punktirt.

Augen in vier gebogenen Reihen, 6, 6, 6, 6 — das Seitenauge grösser, oval.

Die vordern Rückenschilde wenig, die hintern mehr gewölbt, die Fläche, besonders in den Seiten, uneben, rauh, mit zerstreuten grob eingestochnen Punkten, der vierte Hauptschild mit kurzer zahnartiger Verlängerung, deren Innenrand aufgeworfen, die drei hintern Zwischenschilde an den Hinterrandsecken mit sehr langen, spitzen Zahnfortsätzen, deren Innenrand jedoch nicht aufgeworfen.

Die Bauchschilde in der Mitte mit einer rundlichen Impression.

Die Schleppeine sehr lang, das 4 — 7. Glied dicht fein eingestochen punktirt. Das 3. Glied das kürzeste, das 5. das längste, das 4. und 6. gleich lang, das 3. kurz und dick, das 4. stark aufgetrieben, mit tiefer, muldenartiger Längsvertiefung, dicker als das dritte, beide unten mit einer Längsfurche; die übrigen fast walzlich, seitlich nur wenig zusammengedrückt. Am 3. und 4. unten drei Stacheln (ein mittlerer länger und zwei seitliche kürzere), am 5. nur ein Stachel.

Hüftlöcher länglich, 6, 8, 8, 9.

Das ganze Thier oben rothbraun, ebenso die Fühler, Lippentaster, Unterlippe, die hintern Beine und letzten Bauchschild; die Zangenspitze und Zähne der Unterlippe schwarzbraun. Die vordern Bauchschilde und Beine bräunlichgelb.

Vaterland: Neworleans. (Sammlung des Herrn Grafen Keyserling in München.)

## II. Unterabtheilung. Arten mit Zahnfortsätzen an den Zwischenschilden.

### A. Hüftlöcher zahlreich, nicht in bestimmter Ordnung.

*Lithobius impressus.* *F. Koch.*

Zähne der Unterlippe: 12 — 14.

Zahl der Fühlerglieder: 47 — 48.

Hüftlöcher: zahlreich.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 11'''.

Augenstellung: Tab. I. 7. a. und b.

Forstr. *Koch* in Wagner's Reisen in Algier B. III. S. 224.

*Lucas* Algérie. p. 340. pl. 2. f. 4.

*Gervais* Apt. IV. p. 234.

Glänzend, flach.

Kopf breit herzförmig, gemischt grob und fein eingestochen punktirt, mit zerstreuten kurzen Borstchen, breiter Randeinfassung, die Furchenlinie der Kopfspitze weit zurückgehend, in der Mitte etwas eingedrückt. Die Fühler sehr lang, kurzborstig, mit 47 oder 48 Gliedern, die ersten drei Glieder länglich, die übrigen kurz und dick, das Endglied nur wenig verlängert. Die Unterlippe mit tiefer Mittelfurche, beiderseits derselben stark gewölbt, mit breitem, fast geradem Zahnrande, die Mittelkerbe desselben schwach, beiderseits dieser 6 oder 7 stumpfe Zähnen, deren äussere drei, resp. vier, entfernter stehen als die innern. Die Unterlippe gemischt grob und fein eingestochen punktirt, ebenso die Lippentaster.

Die Augenstellung bei beiden Exemplaren, welche ich zur Untersuchung habe, sehr verschieden; bei dem einen vier Querreihen 4, 4, 3, 4 und das Seitenauge nicht grösser als die andern, — bei dem zweiten nur drei Querreihen mit einem sehr grossen Seitenauge, 4, 3, 4.

Die Rückenschilde flach, etwas runzelig, vom fünften Hauptschilde anfangend alle hintern Haupt- und Zwischenschilde dicht körnig rau, die drei hintern Zwischenschilde mit nach hinten stufenweise längern, fast stumpfen Zahnfortsätzen, deren

Innenrand schwach aufgeworfen. Die Bauchschilde glänzender als die Rückenschilde.

Die Schleppebeine sehr lang, das 3. und 4. Glied gleichlang, ebenso das 5. und 6., letztere beide etwas länger, das 4. bis 7. Glied weitschichtig fein eingestochen punktirt. Das 3. Glied am Ende stark keulig verdickt, die übrigen walzlich und dünn. Am Ende des 3. und 4. Gliedes unten drei Stacheln (ein mittlerer langer, zwei seitliche kürzere), je einer am 5. und 6. Gliede. — Die Hüftlöcher rund, grössere und kleinere untereinander, am hintersten acht in zwei Reihen, an den übrigen achtzehn bis zwanzig ohne bestimmte Anordnung.

Hellgelb, die Randeinfassung des Kopfes und der vordern Hauptschilde röthlichbraun; die Beine heller als der Körper. Die Zähne der Unterlippe braunschwarz, die Zangen der Lippentaster gegen die Spitze aus dem Rothbraunen in's Schwarze übergehend.

Vorkommen: Algier und Oran. (Sammlung des Herrn Grafen Keyserling.)

Die beiden Exemplare, welche ich zur Untersuchung vor mir habe, besitzen nur an den drei hintern Zwischenschilden Zahnfortsätze, stimmen übrigens sonst genau mit der von Forstr. Koch gegebenen Beschreibung, — in welcher bemerkt ist, dass an den vier hintern Zwischenschilden Zahnfortsätze seien, überein. — Ich glaube, dass hier lediglich ein Schreib- oder Druckfehler sich eingeschlichen hat.

## B. Die Hüftlöcher in einer einfachen Reihe.

### a. Die Hüftlöcher oval.

#### *Lithobius trilineatus.*

Zähne der Unterlippe: 12.

Zahl der Fühlerglieder: 37—41.

Zahl der Hüftlöcher: 5, 7, 7, 6.

Form der Hüftlöcher: länglich.

Körperlänge:  $9\frac{1}{4}$ ''' (Männchen), 10''' (Weibchen).

Augenstellung: Tab. I. 8.

Sehr glänzend, gewölbt.

Kopf breit herzförmig, oben flach, die Seiten etwas aufgetrieben, uneben, zerstreut grob und fein eingestochen punktirt, die Randeinfassung breit, die Furchenlinie der Kopfspitze deutlich, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Unterlippe breit, zerstreut grob eingestochen punktirt, der Zahnrand breit, in der Mitte tief eingekerbt, beiderseits sechs lange Zähnnchen, von denen die äussern drei entfernter stehen, als die innern.

Die Lippentaster weitschichtig grob eingestochen punktirt.

Die Fühler kürzer als die Körperhälfte, derbgliederig, dicht kurzborstig, 37—41 Glieder, das Endglied verlängert.

Die Augen in sechs Reihen 5, 7, 6, 5, 4, 3. Die Augen der obersten Reihe stehen ziemlich entfernt von einander. Das Seitenauge oval, schräg gestellt.

Die Rückenschilde wenig uneben, an den Hinterecken der drei hintern Zwischenschilde lange Zahnfortsätze mit aufgeworfenem Innenrande.

Die Beine lang, die Schleppebeine 5<sup>'''</sup>, das 3. Glied unten schneidig, ziemlich gerade, d. h. innen nur wenig ausgehöhlt, nach hinten verdickt, ohne Furche, das vierte walzlich oben mit zwei Furchenlinien, die folgenden seitlich stark zusammengedrückt, das fünfte oben ebenfalls mit einer Furchenlinie. Das 3., 4. und 6. fast gleichlang, das 5. etwas länger. Das 4.—7. Glied weitschichtig fein eingestochen punktirt, drei gerade Stacheln (ein mittlerer langer und zwei seitliche kürzere) am 3. und 4. Gliede, zwei am 5. (hier fehlt der innere kürzere).

Die Hüftlöcher länglich, 5, 7, 7, 6.

Die Zäpfchen am zweiten Gliede der weiblichen Genitalien sehr entwickelt, konisch; die Endkrallen mit zwei Seitenzähnnchen unter der Spitze.

Der Rücken des Thieres bräunlichgelb, über sämtliche Rückenschilde zieht ein ziemlich breiter gelber Längsstrich beiderseits von diesem zwei kürzere aber eben so breite, etwas schräg verlaufende Striche. Der Kopf, die Fühler, Unterlippe und Lippentaster röthlichbraun, letztere mit braunschwarzen Zangenspitzen. Die Beine röthlichgelb, die hintern etwas dunkler, die Bauchschilder bräunlichgelb.

Vaterland: Bahia. (Sammlung des Herrn Grafen Keyserling.)

*Lithobius forficatus.* F. Koch.

Zähne der Unterlippe: 10—14.

Zahl der Fühlerglieder: 36—48.

Zahl der Hüftlöcher: beim Männchen: 8, 8, 8, 5 — 7, 7, 7, 5 — 7, 8, 6, 5 — 7, 6, 6, 5 — 6, 6, 6, 4. Beim Weibchen: 8, 8, 8, 6 — 6, 6, 6, 5.

Form der Hüftlöcher: oval.

Körperlänge: 9—11'''.

Augenstellung: Tab. I. 9.

Mit Sicherheit kann bei dieser Art nur citirt werden:

Forstr. Koch, Deutschl. Arach. Myr. und Crust. Heft 40. 20.

Glänzend, bald mehr, bald weniger gewölbt.

Kopf glänzend, breit herzförmig, oben abgeplattet, uneben, mit schmäler, erhöhter Randeinfassung. Die ganze Kopffläche, besonders aber die Kopfspitze, weitschichtig grob eingestochen punktirt; — an der Kopfspitze sind diese eingestochenen Punkte bei allen Exemplaren mehr oder weniger immer zu sehen, während sie auf der übrigen Kopffläche öfters ganz fehlen. Die Furchenlinie der Kopfspitze stets deutlich, — in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler lang, dicht kurzborstig, die Zahl der Glieder steigt bis 48, geht aber nie unter 36 herunter, meist beträgt sie 42 oder 43.

Die Unterlippe an der Basis fast um die Hälfte breiter, als ihre Länge, sehr glänzend, gewölbt mit tiefer Mittelrinne, zerstreut grob eingestochen punktirt. Der Zahnrand breit mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits derselben etwas bogig, Zähne sehr kräftig, stumpf, fast immer in gleicher Entfernung von einander, — beiderseits der Mittelkerbe an Zahl zwischen fünf und sieben wechselnd. Bei einem Exemplar waren auf einer Seite sieben, auf der andern neun Zähne; bei der Mehrzahl sind beiderseits sechs Zähne als Norm anzunehmen. Die Lippentaster sehr

kräftig, glänzend, weitschichtig grob eingestochen punktirt, die Zangen lang, stark gekrümmt.

Die Augen an Zahl und Anordnung sehr variirend, meist in sechs, seltner in fünf, zuweilen in sieben mehr oder minder gebogenen Querreihen. Ihre Gesamtzahl wechselt zwischen 36—67. Auf einer Seite sind zuweilen sieben oder acht mehr als auf der andern. Folgende Anordnung (von oben nach unten gezählt) erscheint als die häufigste:

5, 5, 5, 5, 4, 2 oder 5, 5, 5, 5, 5, 2.

Das hintere grosse Auge oval, — die übrigen Augen meist gleichgross, rund, nur die der untersten Reihen kleiner.

Die Rückenschilde mehr oder weniger gewölbt, glänzend, etwas uneben, die vordern theilweise (und nicht bei allen Exemplaren) grob eingestochen punktirt. Die drei letzten Zwischenschilde an den Hinterecken mit Zahnfortsätzen. Der Innenrand der Zähne ist nur wenig aufgeworfen, bei manchen Exemplaren gar nicht. Die Bauchschilde meist ebenfalls grob eingestochen punktirt, — der letzte mit einer gabeligen Impression. Die Schleppbeine lang, ziemlich dicht kurzborstig, das 3., 4. und 6. Glied gleich lang, das 5. gewöhnlich etwas länger. Das 3. Glied innen ausgehöhlt, gegen das Ende verdickt, unten schneidig zusammengedrückt, das 4. etwas keulig, oben zuweilen mit einer Längsfurche, die übrigen fast walzlich, seitlich etwas zusammengedrückt. Am 3. und 4. Gliede unten drei Stacheln (ein mittlerer längerer und zwei seitliche kurze), am 5. nur zwei, ein längerer in der Mitte und ein kurzer äusserer. Bei manchen Exemplaren sind die Glieder der Schleppbeine dicht fein eingestochen punktirt, bei andern nur weitschichtig, bei vielen gar nicht.

Die Hüftlöcher länglich, vier oder fünf an der hintersten, sechs, sieben oder acht an den übrigen Hüften.

Die zwei Zäpfchen am zweiten Gliede der weiblichen Genitalien kurz und dick, das innere nur wenig kürzer, die Endkrallen stark gekrümmt mit zwei Seitenhäckchen unter der Spitze.

Das Männchen kleiner als das Weibchen.

Der Kopf und die Rückenschilde dunkelrothbraun, vom 2. Hauptschilde an auf jedem in der Mitte ein hellerer Längs-



strich; die Fühler von der Körperfarbe, die letzten Glieder aber röthlichgelb; Unterlippe und Lippentaster röthlichbraun, die Zangenspitze schwarz. — Die Bauchschilde bräunlichgelb, mit heller Seitenumrandung, die letzten drei Bauchschilder röthlichbraun. Die Beine graugelb mit gelben Endgliedern, — die Schleppbeine rothbraun mit heller gefärbten Endgliedern.

Variirt mehr oder weniger glänzend, heller und dunkler.

Bei einem sonst vollständig entwickelten weiblichen Exemplare waren folgende Missbildungen zu bemerken:

- 1) Der rechte Fühler hatte nur 32 Glieder.
- 2) Der linke war vollständig verkümmert und besass nur 11 Glieder, welche aber sonst regelmässig gestaltet erschienen.
- 3) Die linke Unterlippe hatte nur drei vollständig entwickelte Zähne, die übrigen waren nur rudimentär vorhanden.

Vorkommen: *L. forficatus* scheint nur dem mittleren und nördlichen Europa anzugehören. Er kommt in Wäldern und deren nächster Umgebung vor, — zuweilen in Gärten; doch hier wahrscheinlich nur mit Waldstreu eingeschleppt.

### *Lithobius forficatus* var. *villosus*.

Eine auffallende Varietät von *L. forficatus*, welche in den bayerischen Alpen vorkommt, jedoch zu wenig Charakteristisches besitzt, um als eigene Art gelten zu können.

Der Körper ist sehr stark gewölbt, besonders vom 3. Rückenschild an; glänzend. Länge: 11'''.

Der Kopf breit herzförmig, uneben, weitschichtig grob eingestochen punktirt. Fühler mit 43 Gliedern, diese kurzborstig. Die Unterlippe sehr glänzend, kaum bemerkbar eingestochen punktirt; beiderseits mit sechs kräftigen Zähnen, von denen die drei äussern entfernter stehen als die innern. Das zweite Glied der Lippentaster deutlich grob eingestochen punktirt.

Die Augenstellung etwas anders als bei *forficatus*, — Gesamtzahl 68, die Augen dicht aneinander gereiht, ohne bestimmte Anordnung in Querreihen, — dem äussern Umrisse nach traubenförmig.

Die Rückenschilder sehr gewölbt, alle sehr uneben. — Die

drei letzten Bauchschilde an den Rändern und auf der Oberfläche mit langen Borsten ziemlich dicht besetzt.

Die Beine länger als bei *forficatus*, — das Endpaar gerade halb so lang als Kopf und Körper zusammen, — das 3. Glied der Endbeine innen stark ausgehöhlt, an der Spitze verdickt, so lang als das 4., die zwei folgenden länger als die ersten beiden, das Endglied nur halb so lang als das vorhergehende, sämtliche Glieder seitlich zusammengedrückt. Die Hüftlöcher fast noch einmal so lang als bei *forficatus*, daher mehr spaltförmig, je neun an den drei vordern, sechs am hintersten Beinpaare.

Das Weibchen unbekannt.

Die Färbung zeigt keine wesentlichen Unterschiede von *forficatus*.

### *Lithobius parisiensis*.

Zähne der Unterlippe: 16.

Zahl der Fühlerglieder: ?

Zahl der Hüftlöcher: 7, 9, 10, 9.

Form der Hüftlöcher: fein geschlitzt.

Körperlänge:  $13\frac{1}{4}$ '''.

Augenstellung: Tab. I. 10.

Gewölbt sehr glänzend.

Kopf breit herzförmig, uneben, mit verhältnissmässig schmaler Randeinfassung. Die Furche der Kopfspitze deutlich, in der Mitte nicht eingedrückt. Die Kopffläche weitschichtig sehr fein eingestochen punktirt.

Die Fühler langgliedrig (leider abgebrochen, auch die Behaarung bis auf Spuren abgerieben).

Unterlippe sehr breit, mit tiefer Mittelfurche, beiderseits stark gewölbt, weitschichtig grob eingestochen punktirt, Zahnrand sehr breit mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits acht kräftige stumpfe Zähnen, von denen die vier äussern entfernter stehen als die innern. Die Lippentaster gemischt grob und fein eingestochen punktirt.

Seitenauge verhältnissmässig klein, oval, die übrigen in

sechs sehr gebogene Reihen dicht zusammengedrängt. Gesamtzahl 76.

Die vordern Rückenschilde fast glatt, die letzten fünf Hauptschilde körnig rauh. Die letzten drei Zwischenschilder mit langen sehr spitzen Zahnfortsätzen, deren Innenrand kaum bemerkbar aufgeworfen.

Die Bauchschilder von gewöhnlicher Form.

Die Beine lang, besonders die Schleppebeine, 6"', von diesen das 5. und 6. gleichlang, das 4. etwas kürzer, das 3. noch kürzer; letzteres innen ausgehöhlt, die übrigen fast walzlich, seitlich nur wenig zusammengedrückt. Unten am 3. und 4. Gliede eine Längsfurche, ebenso oben auf dem 3.; auf dem 4. oben eine muldenartige Längsvertiefung, vom 4. — 7. alle dicht fein eingestochen punktirt. Drei Stacheln unten am 3. und 4. Gliede (ein mittlerer langer und zwei seitliche äussere kürzere), am fünften Gliede nur ein äusserer.

Hüftlöcher sehr lang und schmal, 7, 9, 10, 9.

Das ganze Thier rothbraun, die Bauchschilder bräunlichgelb, die Zange der Lippentaster schwarz, die Fühler und Beine rostroth.

Vorkommen: Paris. (Sammlung des Herrn Grafen Keyserling.)

## b. Die Hüftlöcher rund.

1. 10 und mehr Zähne an der Unterlippe.

### *Lithobius muscorum.*

Zähne der Unterlippe: 12.

Zahl der Fühlerglieder: 33.

Zahl der Hüftlöcher: 4, 6, 6, 5.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge:  $6\frac{1}{2}$ ".

Augenstellung: Tab. I. 11.

Sehr glänzend, gewölbt.

Kopf herzförmig, gewölbt, etwas uneben, zerstreut borstig,

weitschichtig grob eingestochen punktirt, besonders die Kopfspitze; Randeinfassung schmal, Furchenlinie der Kopfspitze fein.

Fühler sehr kurz, dicht kurzborstig, mit 33 Gliedern, das Endglied nur wenig länger.

Die Augen in vier gebogenen Reihen; das Seitenauge oval, schräg gestellt, die übrigen rund, die Augen der obersten Reihe grösser. 5, 5, 4, 3.

Die Unterlippe sehr gewölbt, weitschichtig grob eingestochen punktirt, der Zahnrand breit, gerundet, mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits sechs lange, spitze Zähne, von denen die äussern drei entfernter stehen als die innern. Die Lippentaster weitschichtig grob eingestochen punktirt.

Die Rückenschilde gewölbt, fast glatt, die drei hintern Zwischenschilde mit langen stumpfen Zahnfortsätzen, deren Innenrand breit aufgeworfen.

Von den Zäpfchen am zweiten Gliede der weiblichen Genitalien das äussere dick und in eine feine Spitze endend, das innere sehr dünn und spitz, die Endkralle sehr fein, wenig gebogen, an der Basis der Kralle zwei seitliche feine und lange Häkchen.

Von den Schleppebeinen das 3.—6. Glied gleich lang, das 3. innen ausgehöhlt, gegen das Ende keulig, unten fast schneidig scharf, die übrigen fast walzlich; seitlich nur wenig zusammengedrückt. Das 3.—7. Glied nicht sehr dicht fein eingestochen punktirt, am Ende des 3. und 4. Gliedes unten drei gerade Stacheln (ein langer mittlerer und zwei seitliche kürzere); am 5. fehlt der innere kürzere. — Die Hüftlöcher rund, 4, 6, 6, 5.

Der Kopf rothbraun, die Kopfspitze und einzelne Längsstreifen vor dem Hinterrande heller. Die Fühler rothbraun mit rostgelber Spitze. Unterlippe und Lippentaster rostgelb, letztere mit rothbrauner Fangkralle, deren Spitze braunschwarz. Rückenschilde rothbraun, in der Mitte des 2.—7. ein heller Längstreif, beiderseits von diesem zwei andere, etwas schräg verlaufende. Bauchschilde und Beine rostgelb; das Endglied der letzteren hellgelb. Die letzten drei Beinpaare rothbraun mit hellgelben Endgliedern.

Vorkommen: Im Moos feuchter Waldungen.

# Lithobius hortensis.

Zähne der Unterlippe: 10—14.

Zahl der Fühlerglieder: 35—45.

Zahl der Hüftlöcher: Männchen: 5, 6, 6, 4 — 4, 5, 5, 4 — 4, 4, 4, 4 — 5, 5, 5, 4 — 6, 6, 6, 4. Weibchen: 6, 6, 6, 5 — 5, 6, 6, 5 — 5, 5, 5, 5 — 5, 7, 7, 4 — 6, 7, 7, 5 — 7, 7, 7, 5.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 5—8'''.

Augenstellung: Tab. I. 12.

Mit *Lithobius forficatus* und *glabratus* F. Koch nahe verwandt, von erstem aber dadurch leicht zu unterscheiden, dass die Hüftöffnungen rund sind; von letzterem darin wesentlich verschieden, dass die Kopffläche deutlich grob eingestochen punktirt, der vorletzte Hauptschild nicht gleichbreit ist und die Beine nicht einfarbig gelb sind.

Der Körper ziemlich gewölbt, sehr glänzend.

Der Kopf uneben, überall mehr oder weniger weitschichtig grob eingestochen punktirt, etwas breiter als lang, der Hinterrand etwas geschwungen. Die Bogenlinie der Kopfspitze deutlich.

Bei der Mehrzahl der untersuchten Exemplare betrug die Zahl der Fühlerglieder 42, bei einzelnen stieg sie auf 45 oder sank auf 35 herunter, — während bei *forficatus* die Zahl der Fühlerglieder häufig bis 48 steigt und nicht tiefer als auf 36 sinkt. Die Fühler ziemlich dicht kurzborstig.

Die Unterlippe weitschichtig grob eingestochen punktirt, der Vorderrand in der Mitte tief eingekerbt, beiderseits nur wenig gebogen, mit fünf bis sieben ganz kurzen, stumpfen Zähnen; die Mehrzahl der Exemplare hat nur fünf Zähne auf jeder Seite. Auffallend ist, dass die Weibchen meist mehr solche Zähne besitzen, als die Männchen. Von elf Weibchen hatten acht sechs Zähne beiderseits, von neun Männchen sieben fünf Zähne.

Fresszangen sehr kräftig und glänzend mit einzelnen grob eingestochenen Punkten, spärlich mit kurzen Borsten besetzt, nur unten am Zangengliede ein Büschel langer, gerader Borsten.

Die Abänderungen bezüglich der Zahl der Augen und ihrer reihenweisen Anordnung sind so bedeutend, dass es schwer hält nur annähernd etwas bestimmtes zu ermitteln.

Die Augen sind meist in fünf Reihen geordnet, ihre Gesamtzahl schwankt zwischen 54 und 29, bei der Mehrzahl 45 oder 42, gewöhnlich in folgender Ordnung der horizontalen Reihen von oben nach unten 5, 5, 6, 4, 2.

Das hintere grosse Auge oval, etwas schräg gestellt, das hintere erste der obersten Reihe grösser als die übrigen.

Alle Rückenschilde gewölbt, fast glatt, in der Gestalt ohne wesentliche Verschiedenheit vom Gewöhnlichen. Der vorletzte vorn breit, nach hinten sehr verschmälert. Der Innenrand der Zahnfortsätze kaum bemerkbar aufgeworfen. Die Bauchschilder sehr glänzend.

Die Schleppe fast halb so lang als Kopf und Körper zusammen; das dritte Glied unten schneidig zusammengedrückt, etwas ausgehöhlt, die übrigen fast walzlich, meist dicht fein eingestochen punktirt, zuweilen sehr weitschichtig, manchmal ohne eingestochene Punkte. Am 3. und 4. Gliede je ein langer mittlerer und zwei seitliche kurze Stacheln, am 5. fehlt der innere kürzere. Das 3., 4. und 6. Glied gleichlang, das 5. etwas länger. Alle Glieder mit kurzen Borsten rings besetzt.

Die Hüftlöcher rund; beim Weibchen am letzten Hüftenpaar meist je sechs, beim Männchen gewöhnlich nur vier solcher Oeffnungen, an den übrigen sechs, fünf oder vier.

Das Männchen kleiner als das Weibchen.

Die Glieder der weiblichen Genitalien kurz und sehr dick, die zwei Zäpfchen am 2. Gliede ebenfalls kurz und dick; die Endkrallen mit zwei Seitenhäkchen unter der Spitze.

Der Kopf rothbraun, die Spitze verdunkelt, die ersten beiden und letzten fünf bis sechs Glieder der Fühler hellgelb, die übrigen bräunlich. Die Unterlippe gelb, das 2. Glied der Lippentaster gelb, die übrigen Glieder röthlichbraun mit schwarzer Zangenspitze. Die Haupt- und Zwischenschilder des Rückens mit Ausnahme der beiden letzten hellgelb, die aufgeworfenen Ränder und die beiden letzten Rückenschilder rothbraun. Die Bauchschilder gelb, ebenso die Hüften, das erste und die beiden letzten Glieder der Beine; die mittlern dunkler gefärbt; an den

beiden letzten Beinpaaren sind blos die Hüftglieder und das Endglied gelb, die übrigen aber bräunlich.

Kommt in Dungstätten, Schutthaufen, in welchen vegetabilische Substanzen vermodern, vor, besonders in Mistbeeten; immer in der Nähe bewohnter Orte. Ich fand diese Art in Nürnberg und der Rheinpfalz (Landstuhl).

## 2. Acht Zähne an der Unterlippe.

### *Lithobius sordidus.*

Zähne der Unterlippe: 8.

Zahl der Fühlerglieder: 43.

Zahl der Hüftlöcher: 4, 4, 4, 4.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 5'''.

Augenstellung: Tab. I. 13.

Glänzend, wenig gewölbt.

Der Kopf rundlich, oben flach, fast glatt, in der Mitte der Kopfspitze ein Grübchen, auf der Kopffläche zerstreut kurze Borstchen und fein eingestochene Punkte, die Randeinfassung breit. Die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler mit 43, dicht langborstigen Gliedern, das Endglied lang.

Unterlippe gewölbt, nicht eingestochen punktirt, der Zahnrand mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits derselben schräg verlaufend, mit 4 Zähnen, drei äusseren grössern und einem kleinern in der Mittelkerbe.

Das Seitenauge oval, ausser diesem, etwas nach oben gerückt, ein fast gleichgrosses, unter diesem zwei kleinere, dann eine dritte Reihe bildend vier kleine.

Die Rückenschilder wenig gewölbt, uneben, an den Hinterrandsecken der drei letzten Zwischenschilder kräftige Zahnfortsätze, deren Innenrand nicht aufgeworfen.

Die Schleppeine mässig lang, zerstreut kurzborstig, das 3., 4. und 6. Glied gleichlang, das 5. kürzer, das 3. gerade

und wie die übrigen seitlich stark zusammengedrückt. Drei gerade Stacheln (ein mittlerer langer und zwei seitliche kürzere) am 3. und 4. Gliede, am 5. keine Stacheln. Das 4.—7. Glied dicht grob eingestochen punktirt.

Die Hüftlöcher rund, 4, 4, 4, 4.

Die Zäpfchen am 2. Gliede der weiblichen Genitalien lang und dünn; die Endkrallen sehr lang und fein, zwei Seitenzähnen unter der Spitze derselben.

Der Kopf dunkelbraun, ebenso die erste Hälfte der Fühler, die andere Hälfte derselben bräunlichgelb, das Endglied rostgelb. Die Unterlippe, die Bauch- und Rückenschilde bräunlichgelb, auf letztern ein weisslicher schmaler Längsstrich in der Mitte. Beine und Schleppbeine gelb.

Vorkommen: Umgebung von München. (Sammlung des Herrn Grafen Keyserling.)

### *Lithobius fossor.*

Zähne der Unterlippe: 8.

Zahl der Fühlerglieder: 49.

Zahl der Hüftlöcher: 5, 6, 5, 4 auch 4, 5, 4, 4.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 5'''.

Augenstellung: Tab. I. 14.

Sehr glänzend, wenig gewölbt.

Kopf herzförmig, glatt, die Randeinfassung breit, die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte eingedrückt.

Die Fühler lang, mit 48 oder 49 nicht sehr dicht langborstigen Gliedern, das zweite Glied lang, das Endglied nur wenig verlängert.

Die Unterlippe stark gewölbt, zerstreut kurzborstig, der Zahnrand breit mit schwacher Mittelkerbe, beiderseits derselben schräg und gerade, mit vier gleichweit von einander entfernten spitzen Zähnen.

Die Augen in drei geraden Reihen; 3, 3, 1 oder 3, 3, 2; das Seitenauge oval, sehr gross, die beiden hintern der obern zwei Reihen grösser als die übrigen.



Die Rückenschilde wenig gewölbt, fast glatt, an den Hinterrandsecken der drei hintern Zwischenschilden spitze Zahnfortsätze, — der Innenrand des ersten aufgeworfen, an den übrigen aber nicht.

Die Schleppebeine sehr lang, alle Glieder seitlich stark zusammengedrückt, nicht sehr dicht fein eingestochen punktirt. Alle Glieder fast gleichlang. Drei gerade Stacheln (ein langer mittlerer und zwei seitliche kürzere) am 3. und 4. Gliede, zwei seitliche am 5. Gliede. Die Hüftlöcher rund, entweder 5, 6, 5, 4 oder 4, 5, 4, 4.

Der Kopf bräunlich gelb, die Fühler etwas dunkler, deren letzte sieben Glieder rostgelb. Die Unterlippe und Lippentaster bräunlichgelb, die Fangkralle der letztern rothbraun. Die Rückenschilde rostgelb, die drei letzten dunkler. Die Beine hellgelb, die Endglieder an ihrer Grundhälfte grau, die letzte Hälfte hellgelb. Die Bauchschilden ebenfalls hellgelb.

Vorkommen: Auf Bergen an etwas trocknen Lagen sowohl im Keuper als Jura (Grütz bei Nürnberg und Ehrenbürg im Wiesenthale).

### *Lithobius piceus.*

Zähne der Unterlippe: 8.

Zahl der Fühlerglieder: 56.

Zahl der Hüftlöcher: 5, 5, 5, 4.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 7'''.

Augenstellung: Tab. I. 15.

Oben wie unten sehr glänzend, wenig gewölbt.

Kopf herzförmig, glatt, gewölbt, weitschichtig sehr fein eingestochen punktirt, in den Seiten und an der Spitze mit langen geraden Borsten zerstreut besetzt; die Randeinfassung breit, die Furchenlinie der Kopfspitze deutlich, in der Mitte etwas eingedrückt.

Die Fühler nicht ganz halb so lang als der Körper, mit 56 Gliedern, das 2. und 3. Glied länger als dick, die übrigen Glieder kurz und dick, dichtborstig, das Endglied kegelförmig, etwas verlängert.

Unterlippe sehr gewölbt, weitschichtig kurzborstig, Zahnrand breit, die Mittelkerbe desselben nicht tief, der Zahnrand beiderseits gerade und mit 4 kräftigen Zähnen in gleicher Entfernung von einander.

Lippentaster fein eingestochen punktirt.

Augen in drei etwas unregelmässigen Reihen, die der beiden obern Reihen je zu vier, gross, — in der letzten nur zwei kleinere. Das Seitenauge gross, eiförmig, stark hervorgewölbt.

Die Rückenschilde wenig gewölbt, fast ganz glatt, weitschichtig fein eingestochen punktirt, die drei letzten Zwischenschilde an den Hinterrandswinkeln mit starken spitzen Zahnfortsätzen, deren Innenrand nur wenig aufgeworfen. Die Bauchschilde von gewöhnlicher Form. Die Beine dünn, lang, die Schleppebeine sehr lang (3'') und dünn, das 3., 5. und 6. gleichlang, das 4. etwas kürzer; das 3. innen etwas ausgehöhlt, unten fast schneidig scharf, die übrigen Glieder ebenfalls seitlich stark zusammengedrückt, nicht sehr dicht fein eingestochen punktirt. Am Ende des 3. und 4. Gliedes unten drei sehr lange gerade Stacheln, von denen der mittlere der längste, am 5. nur die zwei seitlichen kürzeren Stacheln.

Hüftlöcher rund, 5, 5, 5, 4.

Am Ende des 2. Gliedes der weiblichen Genitalien dreikonische Zäpfchen, das äusserste das dickste und längste, die andern nach innen zu stufenweise schwächer und kürzer. Die Endkrallen an der Spitze einfach in zwei Häkchen gespalten.

Der Kopf pechbraun, die Fühler ebenso, nur die letzten 8 Glieder rostgelb, Unterlippe und Lippentaster bräunlichgelb, letztere mit dunkelrothbraunen Zangengliedern, deren Spitze schwarz. Die Rückenschilde bräunlichgelb, die hintern mehr in's Rothbraune gefärbt. Alle Beine bräunlichgelb, die Spitzenhälfte der letzten Glieder rostgelb. Bauchschilde bräunlichgelb, die hintern mehr rostgelb.

Vorkommen: Bayerisches Hochgebirge (Garmisch). Aus der Sammlung des Herrn Grafen Keyserling in München.

### Lithobius coriaceus.

Zähne der Unterlippe: 8.

Zahl der Fühlerglieder: 30—33.

Zahl der Hüftlöcher: 2, 3, 3, 3 — beim Männchen auch 1, 1, 1, 2.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 4'''.

Augenstellung: Tab. I. 16.

Glänzend gewölbt.

Kopf herzförmig, gewölbt, uneben; die Randeinfassung breit, die Fläche mit zerstreuten Borsten besetzt. Die Furchenlinie der Kopfspitze in der Mitte etwas eingedrückt.

Die Fühler halb so lang als der Körper, mit 30 Gliedern, das 2. Glied etwas länger als dick, die übrigen kurz, das Endglied gewöhnlich sehr lang, spärlich mit langen Borsten besetzt.

Die Unterlippe breit, wenig gewölbt, der Zahnrand schmal mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits derselben etwas gebogen, mit vier spitzen Zähnen in gleicher Entfernung von einander. Lippentaster mit langer, wenig gekrümmter Zange.

Augen in drei ziemlich geraden Reihen, alle fast gleich gross, — 4, 3, 2, das Seitenauge grösser, nierenförmig.

Die Rückenschilde wenig gewölbt, runzelig uneben, besonders die vier letzten; die drei hintern Zwischenschilde an den Hinterrandsecken mit kurzen, stumpfen Zahnfortsätzen, deren Innenrand nicht aufgeworfen ist. Die Bauchschilde sehr glänzend mit deutlicher Mittelfurche, in deren Mitte gewöhnlich ein rundes eingedrücktes Grübchen. Die Schleppbeine sehr lang, fast 2''' , am Ende des 3. und 4. Gliedes unten ein langer Mittelstachel und zwei seitliche kürzere, am Ende des 5. nur der mittlere und äussere Stachel, — das 3., 4. und 6. Glied gleichlang, das 5. etwas länger als diese; das 3. Glied unten etwas zusammengedrückt, die übrigen walzlich. Das 4. bis 7. Glied nicht sehr dicht fein eingestochen punktirt, weitschichtig langborstig.

Hüftlöcher rund, an der hintersten Hüfte 2, an den übrigen 3, — beim Männchen zuweilen auch 1, 1, 1, 2.

Am zweiten Gliede der weiblichen Genitalien nur ein kurzes Zäpfchen. Die Endkralle sehr kurz und fein.

Zuweilen sind nur 3, 2, 1 oder 4, 3, 1 Augen vorhanden, bei einzelnen Exemplaren steigt die Zahl der Fühlerglieder auf 33.

Der Kopf braun mit heller Spitze und Randeinfassung, die Fühler rothbraun, gegen die Spitze gelb. Unterlippe und Lippentaster gelb, letztere mit rothbraunen Zangen. Rückenschilde röthlichbraun mit dunkler Einfassung und drei hellen Längsstreifen auf dem zweiten bis drittletzten Hauptschild. Bauchschild gelb. Die vordern fünf Glieder der Beine röthlichgelb, die beiden letzten gelb; ebenso auch die Schleppbeine gefärbt.

Vorkommen: In Gärten und Wäldern. Nicht selten in den verschiedenen Formationen, Keupersand, Keupermergel und Jura.

### 3. Vier Zähne an der Unterlippe.

† *Augen in Reihen geordnet.*

#### Lithobius agilis. F. Koch.

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 31.

Zahl der Hüftlöcher: 3, 4, 4, 4, seltner 3, 4, 4, 5.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge:  $4\frac{1}{4}$  — 5'''.

Augenstellung: Tab. I. 17.

Forstr. Koch, System der Myr. S. 149.

Sehr glänzend, wenig gewölbt.

Der Kopf so lang als breit, etwas uneben, mit einzelnen langen, geraden Borsten, — sehr fein eingestochen punktirt; die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein.

Die Fühler sehr kurz mit 31 kurz borstig behaarten Gliedern.

Der Zahnrand der Unterlippe mit tiefer Kerbe, beiderseits

derselben gerundet mit je zwei Zähnen. Die Lippentaster sehr glänzend.

Bei der Mehrzahl der untersuchten Exemplare sind die Augen in drei Reihen vertheilt; das Seitenauge der mittleren Reihe gegenüber. Die erste Reihe besitzt meist vier Augen, wovon das hinterste das grösste, die übrigen kleiner; die zweite Reihe meist mit drei, die unterste mit zwei Augen, (zuweilen ist auch nur Eines vorhanden).

Die Rückenschilde fein eingestochen punktirt, die drei hintern Zwischenschilde an den Hinterrandswinkeln mit stumpfen Zahnfortsätzen, deren Innenrand gerundet ist. Mit Ausnahme des glatten ersten sind alle übrigen Hauptschilde lederartig runzelig. Neben zahlreichen kleinen Querrunzeln sind fast regelmässig vier Längsrunzeln deutlich zu erkennen, welche von der Mitte des Vorderrandes abgehen und strahlig auseinanderweichen, — die zwei äussern derselben sind länger als die innern.

Das 3., 4. und 6. Glied der Schleppbeine gleichlang, das 3. und 4. walzlich, das 5. und 6. unten etwas zusammengedrückt. Das 4. bis 7. Glied unten weitschichtig fein eingestochen punktirt. Am Ende des 3. Gliedes unten drei gerade Stacheln (ein mittlerer langer und zwei seitliche kürzere), am 4. nur zwei Stacheln, (es fehlt der innere kürzer), am 5. kein Stachel. An den Schleppbeinen vereinzelt lange Borsten. Die Hüftöffnungen rund, am letzten Beinpaar meist drei, an den übrigen vier, seltner fünf.

Die zwei Zäpfchen am 2. Gliede der weiblichen Genitalien sehr lang und dünn; die Endkrallen schwach gekrümmt, lang und dünn, am Ende tief in drei Häkchen gespalten, wovon das mittlere das längste.

Der Kopf und der erste Rückenschild dunkelbraun, letzterer mit hellen Fleckchen gemischt; die Fühler dunkelbraun, die letzten 6—8 Glieder röthlichgelb. Die übrigen Rückenschilde braun, bei helleren Exemplaren in der Mitte ein gelbes Längsstrichen. Die Unterlippe und Bauchschilde hellbraun, ebenso die Beine, deren Endglieder jedoch rostgelb. Die letzten beiden Beinpaare schwarzbraun mit rostgelbem Endgliede.

Das Männchen, welches man ungleich häufiger findet

unterscheidet sich vom Weibchen nur durch die Genitalien.

Abarten finden sich nur bezüglich der Grösse, sowie der helleren oder dunkleren Färbung.

Bisher fand ich diese Art nur in fauler Erlenerde am Fusse des Schmausenbucks bei Nürnberg, hier aber häufig.

In der Beschreibung von F. Koch sind 32 Fühlerglieder angegeben, auch bemerkt derselbe, dass die Runzeln der Rückenschilde ohne bestimmte Ordnung sind; — es kann jedoch kein Zweifel sein, dass unsere Art dennoch hierher gehört, die Anordnung der Runzeln wird erst bei genauer Untersuchung bemerkbar, und ein Fühlerglied mehr oder weniger ist bei den Lithobien ohne alle Bedeutung.

### *Lithobius dentatus. F. Koch.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 41—49.

Zahl der Hüftlöcher: beim Weibchen meist 5, 5, 5, 4 oder 6, 6, 6, 5, bei den Männchen 3, 3, 3, 3 — 5, 5, 4, 3 auch 2, 2, 2, 3.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: Männchen: 4—5½'', Weibchen: 6½—7''.

Augenstellung: Tab. I. 18.

Forstr. Koch, Syst. d. Myr. S. 148.

Breit, gewölbt, glänzend.

Der Kopf rundlich, gewölbt, wenig uneben, sehr fein eingestochen punktiert, spärlich mit Borsten besetzt, die Randeinfassung schmal, die Furchenlinie der Kopfspitze fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler etwas langborstig mit 41—49 Gliedern, meist 47 oder 48, das Endglied verlängert.

Die Unterlippe breit, ohne eingestochene Punkte, der Zahnrand mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits derselben zwei Zähnen.

Die Augen an Zahl sehr variierend, in 3—5 schrägen, wenig gebogenen Reihen, meistens 3, 3, 2, seltner 3, 3, 3, 2 oder 4, 4, 3, 3, 1.

Die Rückenschilde gewölbt, etwas uneben, glänzend, die drei hintern Zwischenschilden an den Hinterecken mit spitzen Zahnfortsätzen, deren Innenrand nicht aufgeworfen.

Die Schleppebeine kurz, das 3. Glied derselben unten seitlich zusammengedrückt, innen ausgehöhlt; die übrigen Glieder ebenfalls seitlich zusammengedrückt und fein eingestochen punktiert, das 3., 5. und 6. fast gleichlang, das 4. wenig kürzer. Am Ende des 3. und 4. Gliedes unten drei Stacheln, (ein mittlerer länger und zwei seitliche kurze); am 5. nur zwei, indem der innere kürzere fehlt. Die Hüftlöcher rund, bei den Weibchen meist 5, 5, 5, 4 oder 6, 6, 6, 5, bei den Männchen 3, 3, 3 oder 5, 5, 4, 3, auch 2, 2, 2, 3.

Die zwei Zäpfchen am 2. Gliede der weiblichen Genitalien kurz und stumpf, die Endkrallen unter der Spitze mit zwei Seitenhäkchen.

Die Männchen weit kleiner und schwächer; die Schleppebeine mehr walzlich, als beim Weibchen.

Der Kopf dunkelrothbraun, stellenweise schwarzbraun verdunkelt, die Rückenschilden bräunlichgelb, mit schwarzbraunem Keilfleck in der Mitte, seitlich von diesem mehrere schwarzbraune Striche; die Seitenränder dunkelbraun. Die Fühler röthlichbraun, die letzten Glieder heller, die Unterlippe und Lippen-taster bräunlichgelb, letztere mit rothbraunen Zangen, deren Spitze verdunkelt aber nicht, schwarz gefärbt ist. Die Bauchschilden und Beine röthlichgelb, am Ende des 5. und 6. Bein-gliedes ein breiter, schwärzlicher Ring, welcher an den vordern Beinen schwächer ist, als an den hintern. Die Männchen meist etwas heller gefärbt.

Vorkommen: Diese Art liebt besonders feuchte Mooreerde, kommt jedoch auch an trocknen Lagen (sonnige Abhänge der Juraformation) vor. Keine Seltenheit.

## Lithobius velox.

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 37.

Zahl der Hüftlöcher: 3, 4, 4, 3, — 3, 4, 3, 3, — 4, 5, 4, 3.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge:  $4\frac{1}{2}$  —  $5\frac{1}{4}$ '''.

Augenstellung: Tab. I. 19.

Glänzend, wenig gewölbt.

Der Kopf so lang als breit, fast glatt, weitschichtig fein eingestochen punktirt, Randeinfassung breit, Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte etwas eingedrückt.

Die Unterlippe lang, sehr glänzend, wenig gewölbt, der Zahnrand schmal, die Mittelkerbe tief, beiderseits derselben zwei spitze Zähnen.

Die Fühler nicht so lang als die Körperhälfte, dicht kurzborstig, mit 37 Gliedern.

Die Augen in drei fast geraden Reihen, 4, 4, 2.

Die Rückenschilde weitschichtig fein eingestochen punktirt, fast glatt, die drei hintern Zwischenschilde mit kurzen stumpfen Zahnfortsätzen, deren Innenrand etwas aufgeworfen.

Das vorletzte und letzte Beinpaar dickgliedrig, von den Schleppebeinen das 3., 4. und 5. Glied gleichlang, das 6. nur wenig kürzer. Am 4. Gliede unten drei Stacheln, wovon der mittlere der längste, die seitlichen kürzer; am 4. nur der mittlere und äussere, am 5. gar keine Stacheln. Das 3. Glied innen ausgehöhlt, unten zusammengedrückt, am Ende verdickt; die übrigen Glieder walzlich, weitschichtig fein eingestochen punktirt.

Die Hüftlöcher rund, beim Männchen 3, 4, 3, 3 oder 3, 4, 4, 3, beim Weibchen 4, 5, 4, 3.

Die Zäpfchen am 2. Gliede der weiblichen Genitalien kurz, aus breiter Basis in eine kurze Spitze endend; die Endkrallen mit zwei Seitenzähnen.

Die Rückenschilde bräunlichgelb, die letzten mehr röthlich, in der Mitte der Hauptschilde ein ziemlich breiter Längsstrich, der aber auf dem ersten und letzten fehlt, gelblich. Der Kopf rothbraun, die Fühler, Unterlippe, Bauchschilde und Lippen-



taster bräunlichgelb, die Zangenspitzen der letztern rötlich; die Beine bräunlichgelb, die beiden letzten etwas dunkler.

Vorkommen: Landstuhl in der Rheinpfalz (bunter Sandstein), Franken (Keupermergel), Umgebung von Wien.

### *Lithobius bucculentus.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlrglieder: 41.

Zahl der Hüftlöcher: 4, 5, 5, 4.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 6'''.

Augenstellung: Tab. I. 20.

Glänzend, flach.

Kopf rundlich, oben flach, uneben, ohne eingestochene Punkte, die Randeinfassung breit, die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler etwas länger als die Körperhälfte, ziemlich langgliedrig, mit 41 kurzbehaarten Gliedern.

Die Unterlippe flach, ohne eingestochene Punkte, so lang als breit, zerstreut mit kurzen Borstchen besetzt, Vorderrand mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits derselben gebogen, mit je zwei kurzen Zähnchen nahe an der Mittelkerbe.

Das erste Glied der Lippentaster stark aufgetrieben, weit-schichtig eingestochen punktirt.

Die Augen in vier fast geraden Reihen 5, 4, 4, 2, Seiten-ange gross, nierenförmig.

Die Rückenschilde flach, runzelig uneben, an den Hinterrandswinkeln der drei hintern Zwischenschilden kurze, sehr spitze Zahnfortsätze, deren Innenrand nicht aufgeworfen.

Die Schleppeine lang,  $3\frac{1}{4}$ '''', das 3. und 6. Glied von gleicher Länge, ebenso das 4. und 5., diese jedoch etwas länger. Das 3. keulig, die übrigen walzlich. Das 4.—7. Glied dicht fein eingestochen punktirt, drei gerade Stacheln (ein langer mittlerer und zwei seitliche kürzere) am 3. und 4. Gliede, am 5. kein Stachel. — Die Hüftlöcher rund, 4, 5, 5, 4.

Der Kopf rostgelb, hinten und in den Seiten verdunkelt;

die Fühler rostgelb, die letzte Hälfte bräunlich, die Unterlippe schmutzig gelb, ebenso die Lippentaster, die Fangkrallen mit schwarzbraunen Spitzen. Die Rückenschilde schmutzig gelb, ein breites Mittelband sowie die Seitenränder bräunlich. Die fünf vordern Glieder der Beine hellgelb, das 6. und 7. rostgelb. Die Schleppbeine, mit Ausnahme des rostgelben Endgliedes, bräunlich. Die Bauchschilde hellgelb, die beiden letzten bräunlich.

Vorkommen: Umgegend von München. (Sammlung des Herrn Grafen Keyserling.)

### *Lithobius melanocephalus. F. Koch.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 36.

Zahl der Hüftlöcher: 4, 6, 6, 5 (Männchen), 5, 5, 5, 4 (Weibchen).

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge:  $6\frac{1}{2}$ ''' (Männchen), 6''' (Weibchen).

Augenstellung: Tab. I. 21.

Forstr. Koch in dem Manuscripte seines Myriapodenwerkes.

Gewölbt, glänzend.

Der Kopf fast herzförmig, gewölbt, etwas uneben, die ganze Fläche fein eingestochen punktirt, die Randeinfassung breit; die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler dicht kurzborstig mit 36 Gliedern.

Die Unterlippe gewölbt, weitschichtig eingestochen punktirt, doch nicht so fein als die Kopffläche, der Vorderrand breit mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits derselben bogig und mit zwei ziemlich grossen spitzen Zähnen.

Die Lippentaster, wie die Unterlippe eingestochen punktirt.

Die Augen in vier geraden Reihen, 4, 5, 3, 2 (Männchen) oder 4, 4, 3, 1 (Weibchen).

Die Rückenschilde gewölbt, fast glatt, durchaus weitschichtig sehr fein eingestochen punktirt, die drei hintern Zwischen-

schilde mit kurzen, stumpfen Zahnfortsätzen, deren Innenrand breit aufgeworfen.

Die Schleppbeine lang ( $3\frac{1}{2}'''$ ), das 4., 5. und 6. gleichlang, das 3. kürzer; das 3. seitlich stark zusammengedrückt, gegen das Ende verdickt, die übrigen ebenfalls seitlich zusammengedrückt, und nicht sehr dicht fein eingestochen punktiert. Das 4. unten mit einer Längsfurche. Am Ende des 3. und 4. Gliedes unten drei gerade Stacheln (ein mittlerer langer und zwei seitliche kürzere), am 5. unten kein Stachel. Die Hüftlöcher rund, beim Männchen 4, 6, 6, 5, beim Weibchen 5, 5, 5, 4.

Das Weibchen kleiner als das Männchen, am Ende des zweiten Genitaliengliedes zwei breite an ihrer Spitze abgerundete Zäpfchen, die Endkralle stumpf mit zwei stumpfen Seitenzähnen.

Der Kopf rostgelb, in der Mitte des Hinterkopfs ein schwärzlicher Flecken, ein gleicher um die Augen. Die Fühler bräunlichgelb, im letzten Dritttheil verdunkelt, die letzten drei bis 4 Glieder aber rostgelb. Die Unterlippe und Lippentaster rostgelb, die Zangen der letztern dunkelbraun. Die Rückenschilde bräunlichgelb, — in der Mitte derselben ein breites, seitlich verwaschenes dunkelbraunes Band, — auch die Seitenränder dunkelbraun gesäumt. Die Bauchschilde bräunlichgelb, in der Mitte eines jeden Schildes ein breiter heller Flecken; die letzten Schilde mehr röthlich. Die Beine hellgelb, die 4., 5. und 6. Glieder der drei letzten Beinpaare an ihrer äussern Seite bräunlich verdunkelt.

Vorkommen: Auf der Ehrenbürg im fränkischen Jura.

### *Lithobius venator.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 38.

Zahl der Hüftlöcher: 4, 5, 5, 4.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge:  $6'''$ .

Augenstellung: Tab. II. 22.

Glänzend, wenig gewölbt.

Kopf herzförmig, oben flach, uneben, weitschichtig sehr fein eingestochen punktirt, an der Kopfspitze etwas gröber; die Randeinfassung breit; die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Augen in drei geraden Reihen, 4, 4, 3, die der obersten Reihe gross, das Seitenauge eiförmig, sehr gross.

Die Fühler kurz mit 38 Gliedern, das Endglied kurz.

Die Unterlippe gewölbt, ohne eingestochene Punkte, zerstreut kurzborstig, der Zahnrand schmal, tief eingekerbt, beiderseits bogig mit zwei entfernt stehenden kurzen Zähnchen.

Die Lippentaster weitschichtig fein eingestochen punktirt.

Rückenschilde wenig gewölbt, fast glatt, sehr fein eingestochen punktirt, die drei hintern Zwischenschilde an den Hinterrandsecken mit kurzen Zahnfortsätzen, deren Innenrand aufgeworfen.

Von den Schleppebeinen das 3., 4. und 6. Glied gleichlang, das 5. etwas länger, das 3. innen ausgehöhlt, unten etwas zusammengedrückt, die übrigen fast walzlich, — alle Glieder mit kurzen feinen Borsten; das 4. — 7. weitschichtig grob eingestochen punktirt. Drei gerade Stacheln am 3. Gliede (ein mittlerer länger und zwei seitliche kürzere), zwei am 4. (der innere kürzere fehlt), keiner am 5. Hüftlöcher rund, 4, 5, 5, 4.

Die Zäpfchen am 2. Gliede der weiblichen Genitalien aus sehr breiter Basis zugespitzt, die Endkrallen an der Spitze tief gespalten, ausserdem noch ein kurzes Seitenzähnen.

Der Kopf rostgelb, gegen die Spitze dunkler, die zwei ersten Fühlerglieder dunkelbraun, die fünf folgenden schmutzig gelb, die übrigen wieder dunkelbraun, das Endglied rostgelb. Die Bauchschilde, Unterlippe und Lippentaster rostgelb, die Fangkrallen der letzten dunkelrothbraun. Die Rückenschilde bräunlichgelb, in der Mitte ein Pfeilfleck dunkelbraun, dieser hat in der Mitte einen weisslichen Längsstrich. Die Hüften und drei ersten Glieder der Beine, sowie die beiden letzten rostgelb, die dazwischen liegenden bräunlichgelb. Von den beiden letzten Beinpaaren nur das 3. und letzte rostgelb, die mittleren bräunlichgelb.

Vorkommen: Fränkischer Jura (Ehrenbürg im Wiesenthal).

† † *Augen nicht in Reihen geordnet.*

### *Lithobius minimus.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 22.

Zahl der Hüftlöcher: 1, 1, 1, 1.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge:  $2\frac{1}{4}$ '''.

Augenstellung: Tab. II. 23.

Glänzend, gewölbt.

Kopf herzförmig, oben flach, in den Seiten hervorgewölbt, glatt, die ganze Fläche mit zerstreuten langen geraden Borsten besetzt. Randeinfassung breit, Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte eingedrückt.

Fühler sehr kurz, mit 22 Gliedern. Das Endglied lang, die übrigen, mit Ausnahme des zweiten dicker als lang, nicht sehr dicht behaart.

Unterlippe wenig gewölbt. Der Zahnrand bogig, schmal, mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits zwei breite kurze Zähnen. Lippentaster kräftig entwickelt im Verhältniss zur Grösse des Thierchens.

Das Seitenauge gross, nierenförmig, diesem sehr nahe, etwas mehr nach oben gerückt, ein gleich grosses rundes, vor diesem und mit ihm die Ecken eines Dreiecks bildend, zwei sehr kleine.

Die Rückenschilde gewölbt, mit starken Längsrünzeln, an den drei hintern Zwischenschilden sehr kurze, stumpfe Zahnfortsätze, deren Innenrand nicht aufgeworfen. Die Schleppbeine kurz, alle Glieder mit Ausnahme der Hüftglieder und des letzten gleichlang, das 3. gegen das Ende verdickt, unten nur wenig zusammengedrückt, das 4. kurz, walzlich, sehr dick; das 5., 6. und 7. stufenweise dünner. Die Glieder nicht eingestochen punktirt, mit vereinzelt dicken Borsten; am Ende des 3. und 4. Gliedes unten nur ein Stachel. Hüftlöcher rund, 1, 1, 1, 1.

Kopf dunkelbraun, die ersten zwei Dritttheile der Fühler schwarz, das letzte hellgelb; Unterlippe und Lippentaster dunkelbräunlichgelb, die Fangkrallen der letztern rothbraun. Die

Rückenschilde bräunlichgelb, die letzten dunkler gefärbt. Bauchschilde gelb, ebenso die Beine.

Vorkommen: In fauler Erlenerde. Scheint sehr selten zu sein.

### *Lithobius immutabilis.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 29—31.

Zahl der Hüftlöcher: 1, 1, 1, 2.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge:  $3\frac{1}{4}$ '''.

Augenstellung: Tab. II. 24.

Ziemlich breit, wenig gewölbt, glänzend.

Der Kopf etwas länger als breit, glatt, sehr weit-schichtig fein eingestochen punktirt, die Randeinfassung breit, die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler etwas langgliederig, dicht langborstig, 29—31 Glieder, das Endglied sehr lang.

Die Unterlippe gewölbt, nach vorne lappig verschmälert, nicht eingestochen punktirt, der Zahnrand mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits zwei entfernt stehende spitze Zähnen.

Die Lippentaster nicht eingestochen punktirt.

Das Seitenauge rund, etwas entfernt von demselben nach vorn und etwas höher stehend ein gleich grosses, abwärts von diesem und vor ihm drei kleinere. Diese Augenstellung ist sehr beständig, wie überhaupt alle Charaktere dieser Art.

Die Rückenschilde wenig gewölbt, stark gerunzelt, besonders in den Seiten; die drei hintern Zwischenschilde mit kurzen, stumpfen Zahnfortsätzen, deren Innenrand nicht aufgeworfen.

Die Schleppeine kurz, die Glieder ziemlich gleichlang, das 4.—7. Glied sehr zerstreut eingestochen punktirt und mit vereinzelt Stachelborsten besetzt, am Ende des 3., 4. und 5. Gliedes unten je ein kräftiger Stachel. Das 3. Glied unten seitlich zusammengedrückt, innen kaum bemerkbar ausgehöhlt, gegen das Ende keulig verdickt, die übrigen fast walzlich, seitlich nur sehr unbedeutend zusammengedrückt. Die Hüftlöcher constant 1, 1, 1, 2, rund.

Der Kopf bräunlichgelb, die Vorderhälfte und die Mittellinie verdunkelt, die Fühler im ersten Drittheil dunkelbraun, dann rostgelb. Die Unterlippe, Bauchschilde und Lippentaster unrein hellgelb, letztere mit rothbraunen Zangen. Die Rückenschilde bräunlichgelb, der letzte dunkelbraun; die Seitenränder ebenfalls dunkelbraun, von derselben Farbe auf dem 2.—6. ein Pfeilfleck in der Mittellinie.

Die Hüftglieder der Beine unrein hellgelb, die übrigen Glieder, mit Ausnahme des rostgelben Endgliedes, bräunlich — ebenso gefärbt auch die Schleppeine.

Vorkommen: In der Holzerde fauler Erlenstöcke.

### *Lithobius macilentus.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 24—37.

Zahl der Hüftlöcher: 3, 3, 3, 3 beim Weibchen, 1, 1, 1, 1 oder 2, 2, 2, 2 beim Männchen.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: Männchen  $3\frac{1}{4}'''$ , Weibchen  $4\frac{1}{4}'''$ .

Augenstellung: Tab. II. 25.

Körper schmal, gewölbt, glänzend.

Der Kopf gewölbt, etwas länger als breit, mit zerstreuten langen Borsten, nicht eingestochen punktiert, die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte nicht eingedrückt. Die Fühler langborstig mit 24—37 Gliedern, das Endglied meist sehr lang. — Unterlippe lang, glatt, ohne eingestochene Punkte, zerstreut kurzborstig, der Zahnrand schmal, in der Mitte tief eingekerbt, beiderseits zwei entfernt stehende Zähnen. Lippentaster ohne eingestochene Punkte.

Das Seitenauge gross, rund; die übrigen kleiner, aber meist gleichgross, in eine Quincunx gestellt, nämlich um ein mittleres vier äussere in einem verschobenen Viereck. Zuweilen ist vorn noch ein kleines Auge ausserhalb der Quincunx; manchmal fehlen aber auch ein oder zwei Augen derselben.

Die Rückenschilde gewölbt, etwas runzelig. An den Hin-

terecken der drei letzten Zwischenschilde kurze, an der Spitze zugerundete Zahnfortsätze, deren Innenrand etwas aufgeworfen ist.

Die Bauchschilde sehr glänzend.

Von den zwei Zäpfchen am 2. Gliede der weiblichen Genitalien das innere viel dünner, die Endkralle kurz mit zwei Seitenzähnen. Zuweilen ist nur ein Zäpfchen am 2. Gliede vorhanden.

Die Schleppbeine kurz, das 3. — 6. Glied fast gleichlang, sehr weitschichtig fein eingestochen punktirt, das 3. innen ausgehöhlt, unten fast schneidig scharf, die andern mehr walzlich, seitlich nur wenig zusammengedrückt. Am Ende des 3. Gliedes unten drei Stacheln (ein langer mittlerer und zwei seitliche kürzere) am 4. nur ein, am 5. kein Stachel. Die Hüftlöcher rund, beim Weibchen am Endpaare drei, an den andern drei oder vier.

Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen durch geringere Zahl der Fühlerglieder (24—31) und haben weniger Hüftlöcher, 1, 1, 1, 1 oder 2, 2, 2, 2.

Das Thierchen oben röthlichgelb, nur der Kopf und erste Rückenschild rothbraun, vom zweiten Hauptschild anfangend auf den übrigen ein feiner weisslicher Längsstrich in der Mitte. Die Fühler bräunlichgelb mit gelber Spitze. Die Unterlippe und Lippentaster bräunlichgelb mit rothbrauner Endkralle. Die Beine röthlichgelb mit hellgelben Endgliedern. Die Bauchschilder bräunlichgelb, die letzten etwas dunkler gefärbt.

Vorkommen: Häufig in fauler Erleerde, aber auch an trocknen Plätzen. (Nürnberg, Fränkischer Jura, Botzen.)



## II. Abtheilung. Arten ohne Zahnfortsätze an den Rückenschilden.

### I. Unterabtheilung. Die Hüftlöcher oval.

#### A. Acht Zähne an der Unterlippe.

Lithobius inermis.

Zähne der Unterlippe: 8.

Zahl der Fühlerglieder: 46.

Zahl der Hüftlöcher: 5, 5, 5, 4.

Form der Hüftlöcher: oval.

Körperlänge: 11'''.

Augenstellung: Tab. II. 26.

Dr. Koch in Rosenhauer „die Thiere Andalusiens“, pag 415.

Der Kopf und der erste Hauptschild, sowie die Unterseite des Körpers sehr glänzend, die übrige Rückenfläche mit mattem Glanze, wenig gewölbt.

Die Kopffläche in der Mitte eingedrückt, die Seiten hervorgewölbt, weitschichtig grob eingestochen punktirt, — der Hinterrand gerade, die Randeinfassung schmal; die Furchenlinie der Kopfspitze deutlich, in der Mitte nicht eingedrückt.

Das Seitenauge rund, nicht sehr gross, — die übrigen Augen fast von gleicher Grösse in 4 geraden Reihen, 3, 3, 3, 2, die Fühler dicht kurzborstig mit 46 Gliedern. Die Unterlippe mit sehr tiefer Mittelfurche, zu beiden Seiten derselben hoch gewölbt, weitschichtig grob eingestochen punktirt, der Zahnrand etwas gerundet, mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits vier stumpfe kurze Zähne.

Das 1. Glied der Lippentaster aufgetrieben, weitschichtig eingestochen punktirt, jedoch feiner als die Unterlippe.

Die Rückenschilde flach, höckerig uneben.

Die Schleppbeine lang, das 3. und 4., dann das 5. und 6. Glied gleichlang, beide letztere etwas länger als die ersteren, das 3. Glied unten mit tiefer Längsfurche, innen ausgehöhlt, gegen das Ende verdickt, das 4. oben mit einer, schwachen Längsfurche, die übrigen Glieder seitlich stark zusammengedrückt, an der Innenseite des 6. — 7. Gliedes eine breite und tiefe Längsfurche. Das 4. bis 7. Glied dicht fein eingestochen punktirt. Am Ende des 3. Gliedes unten drei kräftige Stacheln (ein langer mittlerer und zwei seitliche kürzere) — am 4. zwei (hier fehlt der innere kurze), — am 5. nur ein äusserer Stachel.

Die Hüftlöcher oval, 5, 5, 5, 4.

Die zwei Zäpfchen am 2. Gliede der weiblichen Genitalien sehr lang, etwas nach aufwärts gebogen; die Endkrallen einfach, ohne Seitenzähnen.

Das ganze Thier einfarbig bräunlichroth; der Kopf und die Fühler dunkler; auf ersterem hinter der Furchenlinie zwei schräg verlaufende kurze schwarze Striche, die Fangkrallen der Fresszangen dunkelrothbraun.

Vorkommen: Spanien (Malaga). Sammlung des Herrn Professor Dr. Rosenhauer in Erlangen.

## B. Vier Zähne an der Unterlippe.

### *Lithobius alpinus.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 30.

Zahl der Hüftlöcher: 5, 6, 6, 5.

Form der Hüftlöcher: oval.

Körperlänge: 7'''.

Augenstellung: Tab. II. 27.

Sehr glänzend, gewölbt.

Der Kopf herzförmig, gewölbt, glatt, zerstreut fein eingestochen punktirt, die Randeinfassung breit, — die Furchenlinie

der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler lang, dicht kurzborstig, mit 30 Gliedern, das Endglied nur wenig verlängert.

Die Augen in drei wenig gebogenen Reihen, 4, 4, 3, das Seitenauge nicht sehr gross, oval.

Die Unterlippe stark gewölbt, der Zahnrand breit, bogig, zu beiden Seiten der Mittelkerbe zwei entfernt stehende sehr kräftige Zähne.

Die Rückenschilde gewölbt, glatt.

Die Beine lang, die Schleppbeine fehlen. Die Hüftlöcher oval, 5, 6, 6, 5.

Das 2. Glied der weiblichen Genitalien mit zwei kurzen dicken Zäpfchen, die Endkralle gross mit zwei kurzen Seitenzähnen unter der Spitze.

Das ganze Thier rothbraun, nur die Kopfspitze, die Fühler und Beine heller.

Vorkommen: Seiseralpe im südlichen Tirol. Durch Herrn Prof. P. Gredler erhalten.

### *Lithobius granulatus.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: ?

Zahl der Hüftlöcher: 5, 7, 8, 7.

Form der Hüftlöcher: oval.

Körperlänge: 10'''.

Augenstellung: Tab. II. 28.

Die Beschreibung dieses Thierchens ist nach einem sehr unvollständigen Exemplare verfasst, indem alle Beine fehlen und die Fühler unvollständig sind, doch lässt sich nicht daran zweifeln, dass es eine selbstständige Art repräsentirt.

Glänzend, gewölbt.

Der Kopf länglich herzförmig, weitschichtig fein eingestochen punktirt, oben flach, in den Seiten gewölbt, glatt, die Randeinfassung schmal; die Furchenlinie der Kopfspitze fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler langgliedrig (die Glieder länger als bei irgend einer der mir bekannten Arten), die Behaarung abgerieben (doch dass eine solche vorhanden, noch an Spuren zu erkennen), die Endglieder fehlen.

Die Augen in vier geraden, dicht aneinander liegenden Reihen, das Seitenauge gross, die Augen der beiden obern Reihen grösser als die der untern. — Ordnung: 5, 4, 3, 2.

Unterlippe gewölbt, der Zahnrand bogig, mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits mit zwei kräftigen Zähnen. Die Lippentaster und die Unterlippe deutlich zerstreut eingestochen punktirt.

Die Rückenschilde gewölbt, die letzten fünf Hauptschilder körnig rauh.

Die Bauchschilder mit einem deutlichen Grübchen in der Mitte.

Die Hüftlöcher oval, 5, 7, 8, 7.

Gleichfarbig dunkelrothbraun, die Unterseite etwas heller. Vaterland unbekannt.

## **II. Unterabtheilung. Die Hüftlöcher rund.**

### **A. Die Schleppbeine beim Männchen mit einem Auswuchs.**

*Lithobius curtipes. F. Koch.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: ständig 20.

Zahl der Hüftlöcher: ständig 3, 4, 4, 3.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge:  $3\frac{1}{2}$ —4''.

Augenstellung: Tab. II. 29.

Forstr. Koch, Syst. d. Myr. S. 150.

Sehr glänzend, gewölbt.

Der Kopf rundlich, fast glatt, zerstreut fein eingestochen punktirt; die Randeinfassung breit, die Furchenlinie der Kopfspitze deutlich, in der Mitte eingedrückt.

Die Fühler kurz, fast pfriemenförmig, dichtborstig, ständig mit 20 Gliedern, das Endglied verlängert.

Neben dem Seitenauge ein fast gleich grosses, vor diesem fünf oder vier im Kreise, in dessen Centrum wieder eines; ähnlich der Augenstellung von *L. calcaratus*. Zuweilen ist ein Auge aus seiner gewöhnlichen Stellung hinausgeschoben.

Die Unterlippe gewölbt, verlängert, der Zahnrand schmal mit zwei breiten Zähnen beiderseits der tiefen Mittelkerbe; — beide Zähne nehmen die ganze Breite des Zahnrandes ein.

Die Rückenschilde gewölbt, fast glatt. Die Schleppebeine sehr kurz, dick- und kurzliederig, das 4., 5. und 6. Glied gleichlang, das 3. kürzer; letzteres innen stark ausgehöhlt, die übrigen walzlich, stufenweise dünner, zerstreut kurzborstig und weitschichtig eingestochen punktirt. Am Ende des 3. Gliedes unten drei Stacheln (ein mittlerer langer und zwei seitliche kürzere), am 4. zwei (der innere kürzere fehlt), am 5. kein Stachel.

Die Hüftlöcher rund, ständig 3, 4, 4, 3.

Die Zäpfchen am 2. Gliede der weiblichen Genitalien kurz und dünn, die Endkralle sehr kurz, fast ganz in Borsten versteckt, mit starkgekrümmter zweitheiliger Spitze.

Das Männchen besitzt noch dickere Schleppebeine als das Weibchen; am Ende des 4. Gliedes derselben hat es an der Innenseite einen kurzen kegelförmigen Fortsatz.

Der Kopf röthlichbraun, die Kopfspitze heller; die erste Hälfte der Fühler rostgelb, die letzte röthlichbraun. Die Unterlippe und Lippentaster rostgelb, die Krallen der letztern rothbraun. Die Rückenschilde rostgelb, auf dem hintern in der Mitte ein dunklerer Längsstrich; die Bauchschilde gelb, die letzten bräunlichgelb. Die Beine rostgelb, die Schleppebeine an der Aussenseite bräunlich.

Vorkommen: Diese Art liebt besonders Moorboden, — und ist oft in ganz nassem Sphagnum zu finden. (Nürnberg, Moosgegenden um München.)

F. Koch kannte nur das Weibchen dieser Art. In einer weitläufigeren Beschreibung bemerkt derselbe, dass am Vorderende der Unterlippe die Randzähnnchen fehlten; jedenfalls ist dies nur Folge zu schwacher Vergrösserung, indem diese Zähnnchen bei keinem *Lithobius* fehlen.

*Lithobius calcaratus. F. Koch.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 36—48.

Zahl der Hüftlöcher: 2, 3, 2, 1 — 2, 2, 2, 1, meist 2, 3, 3, 2.

Beim Weibchen auch: 3, 3, 2, 2.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge:  $4\frac{1}{4}$ —5'''.

Augenstellung: Tab. II. 30.

Forstr. Koch, Deutschl. Arach. Myr. u. Crust. Heft 40, 23.

Glänzend, gewölbt.

Der Kopf rundlich, glatt, mit vereinzelt fein eingestochenen Punkten, in den Seiten spärliche Borsten, die Randeinfassung breit, die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte eingedrückt.

Fühler verschieden lang, je nach der Körperlänge meist in ganz regeltem Verhältniss, die Zahl der Glieder zwischen 36—48 wechselnd, das Endglied verlängert.

Neben dem gewöhnlichen Seitenauge, gewöhnlich an dieses anstossend, ein gleich grosses, vor letzterem in einem Kreise vier oder fünf Augen, in dessen Centrum ein mittleres.

Die Unterlippe lang, der Zahnrand mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits von dieser zwei entfernt stehende spitze Zähnen.

Die Rückenschilder gewölbt, fast glatt.

Die beiden letzten Beinpaare dick, die Schleppeine kurz, spärlich kurzborstig, in beiden Geschlechtern verschieden gestaltet.

Männchen: das 3.—6. Glied fast gleichlang, das 3. unten zusammengedrückt, innen ausgehöhlt, gegen das Ende sehr verdickt, das 4. sehr dick, besonders in der Mitte, innen am Ende in einer mehr oder weniger deutlichen Aushöhlung ein kurzes rundes Stielchen, an dessen abgestumpftem Ende ein Kranz von Borsten. Das 5. walzlich, dick, das 6. und 7. stufenweise dünner. Das 4.—7. Glied weitschichtig grob eingestochen punktiert. Am 3. Gliede zwei Stacheln (ein langer äusserer und kurzer innerer), am 4. nur ein Stachel, am 5. keiner. Die Hüftlöcher rund, 2, 3, 2, 1, — 2, 2, 2, 1, am gewöhnlichsten 2, 3, 3, 2.

Beim Weibchen fehlt das Stielchen an den Schleppeinen, das 3.—6. Glied gleichlang, dick, jedoch nach hinten an Dicke abnehmend; die Hüftlöcher rund, meist 2, 3, 3, 2 oder 3, 3, 2, 2.

Das Stielchen am 4. Gliede der Schleppeine des Männchens ist zuweilen sehr wenig entwickelt, oftmals auch nur in der Form eines seitlich behaarten Eckchens an der betreffenden Stelle vorhanden. Bei einem Exemplare fehlte dasselbe ganz, bei diesem war das 4. Glied an seiner Basis und am Ende knotig angeschwollen und in der Mitte dünner (Missbildung).

Die Zäpfchen am 2. Gliede der weiblichen Genitalien kurz und dick, die Endkrallen zweitheilig.

Der Kopf pechbraun, ebenso die erste Hälfte der Fühler, deren zweite rostroth. Die Unterlippe und Lippentaster bräunlichgelb, die Zange der letztern rothbraun. Die Rückenschilde bräunlichgelb, die letzten etwas dunkler, — in der Mitte ein dunkelbraunes Längsband. Die Bauchschilde und Beine bräunlichgelb.

Bei manchen Exemplaren sind auch die Seitenkanten der Rückenschilde dunkelbraun, der letzte Hauptschild netzaderig gezeichnet, zuweilen sind die beiden letzten Beinpaare an der Aussenseite schwarzbraun.

Vorkommen: Häufig in feuchten Waldungen bei Nürnberg, — ebenso in der Juraformation.

## **B. Die Schleppeine beim Männchen ohne Auswuchs.**

### **a. Die Fühler nicht über 22 Glieder.**

#### ***Lithobius crassipes.***

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: ständig 20.

Zahl der Hüftlöcher: beim Männchen: 2, 3, 3, 2 oder 3, 4, 4, 2, beim Weibchen: 3, 4, 4, 2 oder 3, 3, 3, 2.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 4—4½'''.

Augenstellung: Tab. II. 31.

Sehr glänzend, gewölbt.

Der Kopf rundlich, gewölbt, sehr glänzend, weitschichtig sehr fein eingestochen punktirt, fast glatt, die Randeinfassung schmal, — die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte etwas eingedrückt.

Die Augen regelmässig in drei wenig gebogenen Querreihen, das Seitenauge oval, die übrigen gleichgross, entweder 4, 4, 2, oder, jedoch ganz selten, 4, 3, 2.

Die Fühler kurz, ständig mit 20 Gliedern, diese etwas verlängert und ziemlich langborstig.

Die Unterlippe mit tiefer Mittelfurche, zu beiden Seiten derselben stark gewölbt, sehr glänzend und glatt, der Zahnrand schmal, mit tiefer Mittelkerbe, beiderseits zwei kurze spitze Zähnen. Die Lippentaster ebenfalls sehr glatt und glänzend.

Die Rückenschild fast glatt, gewölbt. Die Schleppbeine lang, dickgliederig, das 3. und 6. gleichlang, das 4. etwas kürzer, das 5. das längste. Das 3., 4. und 5. Glied dick, das 6. und 7. viel dünner. Das 3. innen nur wenig ausgehöhlt, das 4. — 7. dicht fein eingestochen punktirt, mit zerstreuten kurzen Borstchen. Drei Stacheln am 3. Gliede (ein mittlerer langer und zwei seitliche kurze), zwei am 4. (hier fehlt der innere kurze), am 5. kein Stachel.

Die Hüftlöcher rund, beim Weibchen meist 3, 4, 4, 2 oder 3, 3, 3, 2 — beim Männchen 2, 3, 3, 2, zuweilen 3, 4, 4, 2.

Die Zäpfchen am 2. Gliede der weiblichen Genitalien aus dicker Basis rasch fein zugespitzt, beide fast gleichlang, — die Endkrallen kurz, unter der Spitze zwei Seitenzähnen.

Der Kopf und erste Rückenschild rothbraun, ebenso die zwei ersten Fühlerglieder, die übrigen heller, gegen die Spitze zu fast gelb. Die Rückenschilde bräunlichgelb, die letzten vier mehr röthlich, die Bauchschilde und Beine schmutziggelb, die Endglieder der letzteren rostgelb. Die Schleppbeine braunroth mit gelbem Endgliede.

Vorkommen: Bisher nur in der Juraformation gefunden. (Umgebung von Nürnberg.)



### *Lithobius sulcatus.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 20—21.

Zahl der Hüftlöcher: 1, 1, 1, 1.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 2—2 $\frac{1}{4}$ '''.

Augenstellung: Tab. II. 32.

Glänzend, wenig gewölbt.

Der Kopf etwas länger als breit, gewölbt, besonders an der Kopfspitze, uneben, die Randeinfassung schmal, die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler kurz, dickgliederig, etwas langborstig, mit 20 bis 21 Gliedern, das Endglied lang.

Der Zahnrand der Unterlippe schmal, tief eingekerbt, beiderseits zwei kurze aneinanderstossende Zähnnchen, welche die ganze Breite des Zahnrandes einnehmen.

Das Seitenauge klein, dicht neben und vor ihm ein grosses Auge, vor diesem, ebenfalls ganz nahe, etwas unter und über ihm je ein kleines.

Die Rückenschilde wenig gewölbt, uneben rau, besonders die letzten; in gewisser Richtung bemerkt man (jedoch schwer zu erkennen) auf den Hauptschilden in deren Mittellinie eine feine Längsfurche.

Die Schleppbeine kurz, dickgliederig, mit einzelnen langen Borsten, das 3.—6. Glied gleichlang, das 3. innen stark ausgehöhlt, gegen das Ende verdickt, unten am Ende ein Stachel. Am Ende des 4. Gliedes ebenfalls nur ein Stachel, dieses und die übrigen Glieder walzlich. Die Hüftlöcher rund, 1, 1, 1, 1.

Das Weibchen grösser, ein sehr kleines Zäpfchen am 2. Gliede der Genitalien, die Endkralle fein, tief zweispaltig.

Der Kopf bräunlichgelb, die vordere Hälfte etwas dunkler gefärbt. Die Fühler braun, die letzten drei Glieder gelb. Die Rückenschilde röthlich, fast violett, nur der erste Hauptschild und die beiden letzten rothbraun. Die Unterlippe und Lippen-taster gelb, die Fangkralle rothbraun.

Die Bauchschilde gelblichweiss, mit einer feinen schwarzen

Linie in der Mitte. Die Beine gelblichweiss, das vorletzte Glied gegen die Spitze hin bräunlich, — ebenso die erste Hälfte der Endglieder, die andere Hälfte derselben gelb. Wie die übrigen sind auch die Schleppbeine gefärbt.

Vorkommen: Bei Nürnberg, nicht selten in der Keuper- und Juraformation.

### *Lithobius aeruginosus.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 20.

Zahl der Hüftlöcher: 2, 3, 3, 2.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 3—3½'''.

Augenstellung: Tab. II. 33.

Schmal, gewölbt, sehr glänzend.

Der Kopf länger als breit, glatt und sehr glänzend; nicht eingestochen punktirt, die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte nicht eingedrückt, die Randeinfassung flach.

Die Fühler kurz, mit 20 Gliedern, langborstig, das Endglied dünner und länger als die übrigen.

Vier oder fünf Augen in einer geraden Linie, das gewöhnliche Seitenauge das kleinste, die übrigen grösser und unter sich gleichgross.

Die Unterlippe lang, stark gewölbt, der Zahnrand sehr schmal, in der Mitte tief eingekerbt, beiderseits zwei spitze Zähne.

Die Rückenschilde gewölbt, glatt.

Die Schleppbeine lang, das 4. und 6. Glied gleichlang, das 5. kürzer und das 3. noch kürzer, — letzteres innen ausgehöhlt, unten schneidig, gegen das Ende verdickt; die übrigen dick, walzlich, zerstreut langborstig, fein eingestochen punktirt. Ein Stachel am 3. und 4. Gliede, am fünften keiner.

Die Hüftlöcher rund, 2, 3, 3, 2.

Das ganze Thierchen rostgelb, die Unterlippe und Lippen-taster etwas dunkler die Beine heller.

Vorkommen: Bisher nur in der Juraformation der Umgegend von Nürnberg gefunden.

b. Die Fühler mit mehr als 22 Gliedern.

1. Auf den Schleppebeinen beim Männchen eine Furche.

*Lithobius mutabilis.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 35—43.

Zahl der Hüftlöcher: ist so variabel, dass sie unten ausführlich angegeben werden muss.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: Weibchen 5—6''' , Männchen 4½—6'''.

Augenstellung: Tab. II. 34.

*Lithobius variegatus.* F. Koch, Deutschl. Arachn. Myr. u. Crust. H. 40. 21.

Glänzend, gewölbt.

Kopf rundlich, zerstreut fein eingestochen punktirt, gewölbt, fast glatt, die Randeinfassung breit. Die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler lang (halb so lang als der Körper) dicht kurzborstig, 35 — 43, gewöhnlich aber 39 Fühlerglieder, das Endglied verlängert.

Die Augen in vier oder fünf etwas gebogenen Reihen, am häufigsten beim Weibchen 4, 3, 4, 3, 2 (4, 3, 3, 3, 2 — 4, 3, 3, 4, 1 — 3, 3, 3, 3, 2 — 3, 3, 4, 3, 2 — 3, 3, 4, 2, 1 — 4, 4, 2, 3, 1 — 4, 4, 2, 1 — 4, 4, 3, 1 — 4, 4, 3, 3). Das Seitenauge oval, — die Augen der obern Reihe kaum etwas kleiner, als das Seitenauge, die der übrigen Reihen nach unten stufenweise kleiner.

Die Unterlippe gewölbt, ziemlich lang, mit vereinzelt eingestochenen Punkten, zerstreut kurzborstig, der Zahnrand breit, mit nicht sehr tiefer Mittelkerbe, beiderseits derselben zwei entfernt stehende, verhältnissmässig kräftige Zähne.

Die Rückenschilde gewölbt, fast glatt, nur in den Seiten etwas uneben.

Die Schleppebeine lang, das 3. und 4. Glied gleichlang, dann das 5. und 6., diese etwas länger, das 3. innen wenig ausgehöhlt, etwas zusammengedrückt, die übrigen walzlich, zer-

streut langborstig, nicht sehr dicht fein eingestochen punktiert, drei Stacheln am 3. und 4. Gliede (ein mittlerer langer und zwei seitliche kürzere), am 5. nur ein Stachel. Hüftlöcher rund, 5, 6, 5, 5 oder 5, 6, 5, 4 (seltner 4, 5, 5, 4 — 5, 5, 5, 5 — 5, 6, 5, 5 — 4, 5, 5, 5 — 4, 4, 4, 3 — 4, 6, 5, 4.)

Die zwei Zäpfchen am 2. Gliede der weiblichen Genitalien kurz und dick, die beiden innern gegen einander gekrümmt, — die Endkralle breit, mit zwei Seitenzähnen unter der Spitze.

Der Kopf rostbraun, in der Mitte ein dunkler Fleck, der Hinterrand gleichfalls verdunkelt, die Fühler braun, gegen die Spitze etwas heller. Die Unterlippe und Lippentaster gelb, die Zangen der letztern rothbraun. Die Rückenschilde bräunlichgelb, mit dunkleren Seitenrändern, in der Mitte der Hauptschilde ein dunkelbrauner Fleck, der am Hinterrande breit, gegen den Vorderrand zugespitzt ist, der letzte Hauptschild rothbraun, der erste Hauptschild dunkelbraun, — die Bauchschilde, Hüftenglieder, sowie das 3. Beinglied bräunlichgelb, das 4. und 5. Glied der Beine dunkelbraun, das 6. und 7. rosthroth, — an den letzten drei Beinpaaren die Hüften bräunlichgelb, die übrigen Glieder mit Ausnahme der Endglieder braun, diese aber rostgelb.

Die Zeichnung und Farbe des Männchens wie beim Weibchen; doch immer heller, — beim Männchen auf dem 5. Gliede der Schleppbeine oben eine breite tiefe Furche; die Schleppbeine überhaupt kürzer und mit dickeren Gliedern. Die Zahl der Hüftlöcher geringer, meist nur 2, 3, 3, 3 (auch 2, 3, 3, 2 — 3, 3, 3, 3 — 3, 3, 3, 2 — 3, 3, 4, 3 — 3, 4, 4, 3 — 3, 5, 5, 4 — 3, 5, 4, 4 — 4, 5, 5, 4 — 4, 6, 6, 4). Die Zahl der Augen ist gewöhnlich auch geringer; bei einem Exemplare wurden sogar nur drei Reihen (3, 4, 4) beobachtet. Gewöhnlich ist das Männchen etwas kleiner; doch findet man auch viele Exemplare, welche so gross sind als die grössten Weibchen. Auch die Zahl der Stacheln an den Schleppbeinen variiert beim Männchen, indem nicht selten am 3. Gliede drei, am 4. nur ein, am 5. kein Stachel vorhanden ist, — bei einzelnen Exemplaren am 4. zwei Stacheln; bei vielen ist auch die Zahl der Stacheln gerade so wie beim Weibchen.

Vorkommen: Gemein sowohl in Keuper- als in Jura-  
gegenden.

Diese Art, von Forstr. Koch für *Lithob. variegatus* Leach gehalten, kann die Species der englischen Autoren nicht sein, indem sie nur 4 Zähne, letztere aber 14 Zähne an der Unterlippe hat. Da der Leach'sche Name der ältere ist, musste ich dieser Art einen neuen beilegen. — Wenn es in der Beschreibung von Forstr. Koch heisst, auf dem 3. Gliede des Endpaares eine Längsrinne, so rührt dies daher, dass von demselben die beiden Hüftenglieder nicht mitgezählt wurden.

Bei dieser Art ist der Wechsel in der Zahl der Fühlerglieder und Augen am auffallendsten; — die in grosser Zahl untersuchten Thiere waren vollständig entwickelt, d. h. geschlechtsreif, wenigstens kann dies von den Weibchen mit Bestimmtheit gesagt werden. Nach den von Gervais (Apt. T. IV. p. 26) mitgetheilten Untersuchungen nimmt bei den Lithobien die Zahl der Fühlerglieder und Augen mit dem Fortschritte der Entwicklung zu; — hiernach lässt sich die Unbeständigkeit dieser Zahlenverhältnisse bei entwickelten Thieren kaum anders erklären, als dass bei den verschiedenen Individuen die Fühler und Augen in ihrer Entwicklung zurückgeblieben seien.

---

## 2. An den Schleppbeinen beim Männchen keine Furchen.

† Die Augen in Reihen geordnet.

---

### *Lithobius cinnamomeus.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 34—38.

Zahl der Hüftlöcher: beim Weibchen 4, 4, 4, 3; beim Männchen: 3, 4, 4, 3 oder 3, 5, 5, 3.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 4—5'''.

Augenstellung: Tab. II. 35.

Glänzend, wenig gewölbt, breit.

Der Kopf herzförmig, fein eingestochen punktirt, die Rand-einfassung breit, die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler kurzgliederig, halb so lang als der Körper oder wenig länger, mit 34 — 38 Gliedern, das Endglied verlängert.

Die Augen in vier stark gekrümmten Reihen, 4, 3, 2, 1, auch 4, 4, 3, 2, die der obersten Reihe grösser als die der andern, — das Seitenauge oval.

Die Unterlippe stark gewölbt, mit breitem Zahnrande, welcher in der Mitte eine nicht sehr tiefe Kerbe hat, beiderseits derselben zwei sehr kräftige Zähne. Weder die Unterlippe noch die Lippentaster eingestochen punktirt.

Die Rückenschilde wenig gewölbt, fast glatt.

Das vorletzte Beinpaar und die Schleppbeine beim Männchen dick, beim Weibchen merklich dünner, von den Schleppbeinen das 4., 5. und 6. Glied gleichlang, das 3. viel kürzer. Das 3. Glied unten schneidig zusammengedrückt, die übrigen fast walzlich, seitlich nur wenig zusammengedrückt, dicht fein eingestochen punktirt, etwas langborstig. Drei Stacheln unten am Ende des 3. und 4. Gliedes, am 5. ein kurzer äusserer.

Die Hüftlöcher rund, beim Weibchen 4, 4, 4, 3, beim Männchen 3, 4, 4, 3 oder 3, 5, 5, 3.

Die weiblichen Genitalien stark borstig, die Zäpfchen am 2. Gliede kurz, das innere kürzer und dünner, beide innen gegen einander gekrümmt, die Endkralle kräftig, unter der Spitze zwei Seitenzähnen.

Kopf zimthroth, die Kopfspitze heller, die Fühler ebenfalls zimthroth, auch die Unterlippe und Lippentaster von derselben Farbe, die Krallen der letzten mehr dunkelrothbraun. Die Bauchschilde bräunlichgelb, die letzten vier und die Beine zimthroth, nur die Hüftenglieder sowie die ganzen Schleppbeine bräunlichgelb, Die Rückenschilde dunkler röthlichbraun, die beiden letzten zimthroth.

Vorkommen: Bisher nur in der Juraformation gefunden.

*Lithobius muticus.* F. Koch.

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 36—43.

Zahl der Hüftlöcher: 3, 4, 3, 3 — 4, 5, 4, 4 oder 4, 4, 4, 3.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 5—5½'''.

Augenstellung: Tab. II. 36.

F. Koch, Syst. der Myr. S. 151.

Mit *L. variegatus* nahe verwandt, doch durch die fehlende Furche der Schleppeine beim Männchen, und das nicht nach Innen gekrümmte Zäpfchen am 2. Gliede der Genitalien beim Weibchen leicht von ihm zu unterscheiden, vom Weibchen des *L. calcaratus*, mit welchem diese Art ebenfalls grosse Aehnlichkeit besitzt, durch die dreitheilige Endkrallen der Genitalien ebenfalls verschieden.

Glänzend, gewölbt, breit.

Der Kopf rundlich oben flach, etwas uneben, weitschichtig fein eingestochen punktirt, die Randeinfassung schmal; die Furchenlinie der Kopfspitze fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler nicht halb so lang als der Kopf und die halbe Körperlänge zusammen, ziemlich langborstig, 36—43 Glieder, meist 40, das Endglied verlängert.

Das Seitenauge fast rund, — die übrigen Augen in vier wenig gebogenen Reihen, ziemlich regelmässig 4, 4, 3, 2 oder 4, 4, 3, 1 — seltener 4, 4, 4, 2.

Die Unterlippe gewölbt, der Zahnrand breit, die Mittelkerbe tief, beiderseits zwei kurze Zähnchen. Die Lippentaster fein eingestochen punktirt.

Die Rückenschilde breit, gewölbt, fast glatt.

Die Schleppeine lang, das 3. und 4., dann das 5. und 6. gleichlang, die beiden letzten etwas länger als erstere. Das 3. Glied innen ausgehöhlt, unten schneidig, am Ende sehr verdickt, die übrigen fast walzlich, seitlich nur wenig zusammen-

gedrückt, deutlich eingestochen punktirt. Am Ende des 3. und 4. Gliedes unten drei kräftige Stacheln (ein mittlerer langer und zwei seitliche kürzere), am 5. nur ein Stachel.

Die Hüftlöcher rund, meist 3, 4, 3, 3, zuweilen 4, 5, 4, 4 oder 4, 4, 4, 3.

Am 2. Gliede der weiblichen Genitalien zwei kurze, gerade, aus dicker Basis feinspitzige Zäpfchen, die Endkrallen mit einer gebogenen Spitze und zwei seitlichen Zähnen.

Die Schleppe beim Männchen dicker als beim Weibchen.

Der Kopf bräunlichgelb, netzaderig braun, auch eine feine Linie zwischen den Augen braun, die Fühler bräunlichgelb, die beiden ersten und die letzten Glieder heller. Die Unterlippe und Lippentaster gelb, die Krallen der letzteren rothbraun. Die Bauchschilde bräunlichgelb, in der Mitte eines jeden ein grösserer hellerer Flecken. Die Rückenschilde olivenfarbig, ein breiter Längsstreif in der Mitte und die Seitenränder braun. Die ersten fünf Glieder der Beine gelblich, die übrigen schwärzlich und nur am Ende gelblich.

Die Männchen dunkler, so dass oft der Rückenstreif nicht mehr zu erkennen ist.

Vorkommen: Allenthalben in der Jura- und Keuperformation nicht selten, auch in den Moorgegenden des bayerischen Hochlandes.

---

### *Lithobius communis. F. Koch.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 33—36.

Zahl der Hüftlöcher: 2, 3, 3, 2, beim Männchen auch 3, 4, 4, 3.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 4—5 $\frac{1}{4}$ '''.

Augenstellung: Tab. II. 37.

Forstr. Koch, Deutschl. Arach. Myr. und Crust. Heft 40. 24.

Glänzend, gewölbt.

Der Kopf rundlich, sehr gewölbt, fast glatt, mit zerstreuten langen Borsten; sehr fein eingestochen punktirt, die Randein-



fassung breit, die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler ziemlich langborstig, mit 33—36 Gliedern, die ersten drei und die Glieder des letzten Dritttheils länger als die übrigen, das Endglied ebenfalls verlängert.

Die Augen in drei geraden, schräg verlaufenden Reihen, 3, 3, 2; — das Seitenauge oval, sehr gross. Nicht selten findet man auch 4, 3, 2 — 4, 3, 1 —; einmal waren sogar 4 Reihen, 3, 3, 3, 1 vorhanden.

Die Unterlippe wenig gewölbt, der Zahnrand schmal, die Mittelkerbe nicht tief, beiderseits zwei entfernt stehende, aus breiter Basis feinspitzige Zähnen.

Die Rückenschilde gewölbt, uneben.

Die Schleppebeine ziemlich lang, etwas zerstreut langborstig, das 4., 5. und 6. Glied gleichlang, das 3. etwas kürzer; letzteres innen ausgehöhlt, die übrigen walzlich, fein eingestochen punktirt. Am 4. und 5. Gliede unten eine oder zwei Reihen kleiner Grübchen. Drei Stacheln am Ende des 3. und 4. Gliedes (ein mittlerer langer und zwei seitliche kürzere), ein Stachel an der Aussenseite des 5. Gliedes.

Die Hüftlöcher rund, 2, 3, 3, 2, auch 3, 4, 4, 3 (Männchen).

Am 2. Gliede der weiblichen Genitalien ein äusseres langes und dickes, gerades Zäpfchen und ein inneres sehr kleines dünneres, etwas nach innen gekrümmtes; die Endkralle unter der Spitze mit zwei Seitenzähnen.

Der Kopf braun, gegen die Spitze verdunkelt, auch in der Mitte der Kopffläche ein dunkler Flecken; die Fühler pechbraun, nur das Endglied gelb. Die Rückenschilde bräunlichgelb, ein dunkelbrauner Längsstrich auf dem 3. — 9. Haupt-schilde (zuweilen fehlt dieser Längsstrich), die Seiteneinfassung der Rückenschilde ebenfalls dunkelbraun gesäumt; — die Unterlippe und Lippentaster gelb, letztere mit rothbraunen Zangen. Die Bauchschilde unrein gelb; die vier ersten Glieder der Beine gelb, die beiden folgenden braun, das Endglied an seiner ersten Hälfte ebenfalls braun, am Ende gelb. An den drei letzten Beinpaaren die Hüftenglieder gelb, die übrigen braun, mit Ausnahme des gelben Endgliedes.

Vorkommen: Scheint sehr verbreitet zu sein, bei Nürnberg sehr häufig; auch in der Juraformation.

### *Lithobius lucifugus.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 42.

Zahl der Hüftlöcher: 4, 6, 6, 5.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 7'''.

Augenstellung: Tab. II. 38.

Sehr glänzend, breit, beinahe flach.

Der Kopf breit herzförmig, uneben, mit theils fein, theils gröber eingestochenen Punkten (letztere besonders an der Kopfspitze) die Randeinfassung breit, die Furchenlinie der Kopfspitze deutlich, in der Mitte etwas eingedrückt.

Die Fühler mit 42 Gliedern, ziemlich langborstig.

Die Unterlippe gewölbt, weitschichtig grob eingestochen punktirt, die Mittelkerbe des Zahnrandes tief, dieser zu beiden Seiten derselben breit und bogig, mit zwei entfernt stehenden kurzen spitzen Zähnen.

Die Lippentaster weitschichtig grob eingestochen punktirt.

Das Seitenauge nicht sehr gross, oval, die Augen in fünf unregelmässigen, gebogenen Reihen, 4, 5, 5, 3, 2, die der obersten Reihe grösser als die andern.

Die Rückenschilder flach, in den Seiten uneben, doch ohne deutliche Runzelung.

Die Schleppeine kurz, das 3. und 4. Glied gleichlang, ebenso das 5. und 6., letztere beide aber viel länger als erstere. Sämmtliche Glieder seitlich stark zusammengedrückt, zerstreut kurzborstig, sehr dicht fein eingestochen punktirt. Am Ende des 3. und 4. Gliedes unten je drei Stacheln (ein mittlerer länger und zwei seitliche kürzere) am 5. nur ein Stachel.

Die Hüftlöcher rund, 4, 6, 6, 5.

Der Kopf gelb, theilweise braun geadert, die Kopfspitze heller gefärbt, die Unterlippe gelb, — deren Zähne nur an der Spitze schwarzbraun. Die Lippentaster gelb, mit dunkel-

rothbraunen Zangen. Die Rückenschilde gelb mit einem schwärzlichen Längsstrich in der Mitte, welcher nur auf dem letzten Hauptschild fehlt. Die Bauchschilde ebenfalls gelb, nur die letzten mehr bräunlichgelb. Die Beine ganz gelb.

Vorkommen: Im südlichen Tyrol (Bozen). Durch Herrn Prof. P. Gredler erhalten.

### *Lithobius erythrocephalus* F. Koch.

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlrglieder: 26—33.

Zahl der Hüftlöcher: beim Weibchen meist 4, 5, 5, 4,  
beim Männchen 3, 4, 4, 3.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge:  $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{4}$ ''' (Männchen), 5— $6\frac{1}{4}$ ''' (Weibchen).

Augenstellung: Tab. II. 39.

Forstr. Koch, Syst. d. Myr. S. 150.

Sehr glänzend, wenig gewölbt.

Der Kopf so lang als breit, wenig gewölbt, oben abgeplattet mit unebener Fläche, weitschichtig fein eingestochen punktirt, die Furchenlinie der Kopfspitze gewöhnlich in der Mitte etwas eingedrückt.

Die Fühler kurz, mit kurzen Borstchen rings besetzt, 26 bis 33 Glieder (bei der Mehrzahl 29), das Endglied verlängert.

Die Unterlippe zerstreut ziemlich grob eingestochen punktirt, der Zahnrand in der Mitte schwach eingekerbt, beiderseits zwei entfernt stehende Zähnen. Die Lippentaster zerstreut fein eingestochen punktirt.

Die Augen ziemlich regelmässig in drei geraden Reihen, meist 4, 4, 2 oder 4, 3, 2, seltner 3, 3, 2, sehr selten vier Reihen. Das grosse Seitenauge gewöhnlich der 2. Reihe gegenüber.

Die Rückenschilde mässig gewölbt, weitschichtig eingestochen punktirt, fast glatt.

Die Schleppebeine von mässiger Länge, das 3.—6. Glied fast gleichlang, das 3. Glied innen ausgehöhlt, die übrigen walzlich, mit zerstreuten langen Stachelborsten und nicht sehr dicht grob eingest-

chen punktirt. Am 3. und 4. Gliede drei Stacheln (ein mittlerer länger und zwei seitliche kürzere), am 5. nur ein äusserer seitlicher Stachel.

Die Hüftlöcher rund, an Zahl sehr variirend; bei den Weibchen meist zahlreicher, gewöhnlich 4, 5, 5, 4, bei den Männchen meist 3, 4, 4, 3.

Die Zäpfchen am 2. Gliede der weiblichen Genitalien breit und fast stumpf; die Endkrallen gewöhnlich tief gespalten und mit einem Seitenzähnen, zuweilen ist sie am Ende breit und dann dreizahnig.

Die Männchen sind viel kleiner und schwächer gebaut.

Die vordere Hälfte des Kopfes schwarz, die hintere hellrothbraun; die Fühler dunkelbraun, nur die letzten 4—5 Glieder hellgelb. Die Unterlippe und Lippentaster bräunlichgelb, die Zangen der letztern braun, die Rückenschilde unrein hellbraun mit dunklem Längstreifen; der erste und die beiden letzten Schilde mehr röthlichbraun. Die Bauchschilde bräunlichgelb, ebenso die ersten vier Beinglieder, das 5. und 6. schwärzlich, das 7. gelblich. — Die Hüftenglieder der beiden Hinterpaare bräunlichgelb, das 3., 4., 5. und 6., sowie die Basis des 7. schwärzlich, die Spitze des 7. gelb.

Vorkommen: Lebt im Moose mit trockner, feinsandiger Unterlage. Ich fand ihn sowohl in der Jura- als Keuperformation, doch nie an feuchten Stellen. Auch von Bozen erhielt ich diese Art durch Herrn Prof. P. Gredler.

---

† † *Die Augen nicht in Reihen geordnet.*

---

### *Lithobius minutus. F. Koch.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 24—28.

Zahl der Hüftlöcher: 1, 1, 1, 1 — sehr selten 1, 2, 2, 1 oder 2, 2, 2, 2.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 2—3'''.

Augenstellung: Tab. II. 40.

*F. Koch, System der Myriap. S. 152.*

Glänzend, gewölbt.

Der Kopf rundlich, sehr glänzend, gewölbt, etwas uneben, mit zerstreuten Borsten, die Randeinfassung breit, die Furchenlinie der Kopfspitze fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Die Fühler etwa halb so lang als der Körper; spärlich kurzborstig mit 24—28 Gliedern.

Ein grosses ovales Seitenauge, vor ihm vier kleinere in den Ecken eines verschobenen Vierecks; doch fehlt es nicht an verschiedenen Varietäten der Augenstellung, je nachdem eines oder mehrere der Augen von seinem normalen Platze verdrängt ist.

Die Unterlippe gewölbt, kurz, der Zahnrand schmal mit tiefer Mittelkerbe, an beiden Enden jeder Zahnrandhälfte ein kleines Zähnchen.

Die Rückenschilde gewölbt, in den Seiten fein gerunzelt.

Das 3.—6. Glied der Schleppbeine gleichlang, — das 3. innen stark ausgehöhlt, unten seitlich zusammengedrückt, die übrigen walzlich mit einzelnen langen Borsten und weitschichtig eingestochen punktirt. Am Ende des 3. und 4. Gliedes unten je ein einzelner Stachel. Die Hüftlöcher rund, gewöhnlich 1, 1, 1, 1, sehr selten 1, 2, 2, 1 oder 2, 2, 2, 2.

Der Kopf bräunlichgelb, ebenso die Fühler, diese gegen die Spitze zu heller, — die Unterlippe und die Lippentaster schmutzig hellgelb, letztere mit rothbraunen Zangen. Die Bauchschilde gelb, in der Mitte mit einem weisslichen Flecken; die Rückenschilde bräunlichgelb, mit einem kleinen schwärzlichen Pfeilfleck in der Mitte. Die Hüftenglieder der Beine gelblichweiss, die übrigen Glieder bräunlich, nur das letzte gelb, ebenso sind auch die Schleppbeine gefärbt. — Das Thierchen variirt übrigens in der Färbung sehr, — der Pfeilfleck auf den Rückenschilden erreicht oft den Vorderrand nicht, zuweilen kaum die Mitte des Schildes, manchmal fehlt er ganz.

Vorkommen: Nicht selten in den Jura- und Keuper-gebenden.

Diese Art stimmt bezüglich der Färbung nicht ganz zu der Beschreibung von Forstr. Koch, auch haben meine Exemplare fein gerunzelte Rückenschilde; doch zweifle ich nicht, dass sie hierher gehören.

### Lithobius lubricus.

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 27—37.

Zahl der Hüftlöcher: 2, 2, 2, 2 oder 1, 2, 2, 1.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge:  $2\frac{1}{4}$ — $3\frac{1}{4}$ '''.

Augenstellung: Tab. II. 41.

Mit *curtipes* und *calcaratus* verwandt, doch wesentlich von beiden verschieden.

Sehr glänzend, gewölbt.

Der Kopf rundlich, glatt, gewölbt, die Randeinfassung breit, die Furchenlinie der Kopfspitze sehr fein, in der Mitte eingedrückt.

Die Augenstellung von der des *Lithobius calcaratus* nicht verschieden.

Die Fühler fast pfriemenförmig, kurz, die erste Hälfte wenig, die andere dicht kurzborstig behaart, mit 27—37 Gliedern, deren letztes verlängert.

Die Unterlippe gewölbt, sehr glänzend, der Zahnrand schmal, die Mittelkerbe nicht tief, beiderseits zwei spitze feine Zähnchen.

Die Rückenschilde gewölbt, fast glatt.

Die Schleppbeine kurz, das 3., 5. und 6. Glied gleichlang, das 4. etwas kürzer, das 3. innen ausgehöhlt, gegen das Ende verdickt, das 4. Glied kurz, dick, walzlich, die übrigen stufenweise dünner, das 4.—7. Glied weitschichtig eingestochen punktirt, spärlich mit langen und kurzen Borstchen besetzt. — Am 5. Gliede unten eine oder mehrere Reihen gröber eingestochener Punkte, bald mehr bald weniger deutlich. Am 3. und 4. Gliede unten vor dem Gelenkende ein langer gerader Stachel. Die Hüftlöcher rund 2, 2, 2, 2 oder 1, 2, 2, 1.

Am 2. Gliede der weiblichen Genitalien ein langes und ein sehr kurzes Zäpfchen, beide dünn. Das Endglied sehr kurz, die Endkrallen sehr fein, stark gekrümmt.

Der Kopf und der erste Hauptschild pechbraun, — ebenso die Fühler, deren letzte 2 — 3 Glieder gelb. Die Unterlippe und Lippentaster heller braun, letztere mit rostrothen Zangen.

Bauchschilde olivenfarbig, ebenso die Rückenschilde, diese in der Mitte mit einem dunkleren Längsstrich, — die Beine hellbraun, nur die Endglieder gelb.

Vorkommen: Nicht selten in der Umgegend von Nürnberg, (Jura- und Keuperformation).

### *Lithobius carinatus.*

Zähne der Unterlippe: 4.

Zahl der Fühlerglieder: 32.

Zahl der Hüftlöcher: 3, 3, 3, 3, oder 3, 3, 3, 4.

Form der Hüftlöcher: rund.

Körperlänge: 11'''.

Augenstellung: Tab. II. 42.

Körper gewölbt, glänzend.

Der Kopf so lang als breit, uneben, mehr oder weniger grob eingestochen punktirt, die Randeinfassung schmal, Furchenlinie der Kopfspitze fein, in der Mitte nicht eingedrückt.

Das Seitenauge sehr gross, nierenförmig, vor ihm in gleicher Höhe ein grosses rundes und unter letzterm vorne zwei dicht aneinander stossende, in schräger Linie stehende, kleine.

Die Fühler lang, kurzborstig, mit 32 Gliedern, das Endglied verlängert, eiförmig.

Die Unterlippe wenig gewölbt, nicht eingestochen punktirt, Zahnrand bogig, mit schwacher Mittelkerbe, beiderseits zwei entfernt stehende kurze Zähnchen.

Lippentaster ohne eingestochene Punkte.

Die Mittellinie der Rückenschilde erhaben, — die Hauptschilde in den Seiten stark gerunzelt.

Die Beine, auch das Endpaar im Verhältniss zur Körpergrösse sehr kurz. Das 3.—6. Glied der Schleppbeine von gleicher Länge, das 3. innen stark ausgehöhlt, gegen das Ende verdickt, die übrigen walzlich, — das 3. und 4. Glied mit kurzen starken Borsten, die übrigen fast kahl. Drei Stacheln (ein mittlerer langer und zwei seitliche kurze) am 3. und 4. Gliede, ein äusserer kurzer am 5.

Die Hüftlöcher rund, sehr gross, 3, 3, 3, 3 oder 3, 3, 3, 4.

Der Kopf hellbräunlichgelb, die Furchenlinie der Kopfspitze in einem breiten weisslichen Bande, die Randeinfassung dunkler. Das ganze Thier sonst auch bräunlichgelb, der Hinterrand der Körperschilde dunkler, die Zangen der Lippentaster dunkelbraun.

Vorkommen: Griechenland.

Es folgen nunmehr die Arten anderer Autoren, welche ich nicht in Einklang mit den von mir untersuchten zu bringen vermag.

### 1. *Lithobius variegatus*.

Leach, Zool. Misc. III. *Lithobius* spec. 2. p. 40.

Umgebung von London.

Die von Forstr. Koch als *variegatus* Leach beschriebene Art hat nur 4 Zähne an der Unterlippe, während die Leach'sche deren 14 besitzt.

### 2. *Lithobius rubriceps*.

Newp. Linn. Trans. XIX. p. 364.

Aus Spanien.

### 3. *Lithobius fasciatus*.

Newport, Linn. Trans. XIX. p. 365.

Italien (Florenz und Neapel). Höchstwahrscheinlich *Lith. punctulatus* F. Koch.

### 4. *Lithobius mexicanus*.

Perbosc. Rev. Cuvier de M. Guérin, 1839. p. 261.

Mexiko.

### 5. *Lithobius multidentatus*.

Newp. Linn. Trans. XIX. p. 365.

Newyork.



Es lässt sich nicht ermitteln, welche Art hier gemeint ist, indem in den Beschreibungen von Newport und Gervais weder der Augen, der Fühlorgliederzahl noch der Beine Erwähnung gethan ist.

#### 6. *Lithobius americanus*.

Newp. Linn. Trans XIX. p. 365.

Nordamerika.

#### 7. *Lithobius spinipes*.

Say Journ. Acad. Nat. sient. Philad. II. p. 108.

Newport reiht diese unter die vorhergehende Art ein.

Nach der ziemlich genauen Beschreibung von Say passt diese in Nordamerika sehr gemeine Art zu keiner der von mir beschriebenen.

#### 8. *Lithobius planus*.

Newp. Linn. Trans. XIX. p. 366.

Nordamerika.

Die Art steht meinem *Lith. mordax* ziemlich nahe.

#### 9. *Lithobius Hardwickei*.

Newp. Ann. Nat. Hist. XIII. p. 96.

Singapore.

#### 10. *Lithobius longicornis*.

Risso Europ. merid. V. p. 154.

Nizza.

#### 11. *Lithobius forficatus*.

Welcher aus der Zahl der früher beschriebenen Arten unser deutscher *Lith. forficatus* ist, lässt sich nicht mehr ermitteln, — die frühern Beschreibungen waren zu unvollständig und gaben nur Merkmale, welche der ganzen Gattung zukommen.

Die Beschreibung der *Scolopendra forficata* von Linné

(System. Nat. ed. 10. Tom. I. pars II. p. 1062. und fauna suecic. p. 362) — scolopendra plana, pedibus utrinque quindecim. Rubra est vix digitum transversum longa. Pedes antici crassi et validi, ultimi longissimi, hinc cauda quasi bifurca, — corporis articuli alterni reliquis dimidio breviores — gibt eben nur Gattungscharaktere an, — in gleicher Weise

*Fabricius*, Ent. Syst. T. II. p. 390.

*Degeer*, (Uebersetzung von Goeze) B. VII. p. 202. und

*Walckenaer*, Faune Paris. T. II. p. 178.

Ebensowenig lässt sich mit Bestimmtheit ermitteln, ob Panzer den *Lith. forficatus* oder eine andere Art bei seiner ganz unkenntlichen Abbildung vor sich hatte.

Schrank (Enum. insect. Austr. p. 538) bringt verschiedenartige Thiere mit dem *Lith. forficatus* zusammen. Haec species occurrit pedibus utrinque 13, 15 et 22; — die Thiere mit 13 Füßen liessen sich wohl als unentwickelte Exemplare erklären, — aber 22 Beinpaare bei einem *Lithobius*?! — In gleicher Weise unbestimmt ist die Beschreibung Schrank's in seiner fauna boica: hellmuschelbraun, das letzte Fusspaar länger, rückwärts ausgestreckt.

Auch Léon Dufour bezweifelt, ob seine Art dieselbe, an welcher Treviranus seine anatomischen Untersuchungen anstellte.

So walten die Zweifel über den *Lithobius forficatus* fort und fort, — und selbst die neuern Forscher Gervais und Newport sind zu keiner Verständigung gekommen.

Doch lassen die von ihnen (Gervais Apt. IV. p. 229 und Newport Catal. of the Myriap. in the coll. of the Brit. Mus.) gegebenen Beschreibungen mit Bestimmtheit erkennen, dass sie eine andere Art als unseren *Lith. forficatus* vor sich hatten; und, weil sie die Exemplare von Leach zu untersuchen Gelegenheit hatten, dass auch der *Lith. forficatus* des letzern nicht der unsere ist.

*Lithobius laevilabrum* Leach (Edinb. Enc. VII. p. 409) ist nach Newport synonym mit seinem *Lith. forficatus*.

Der *Lithob. forficatus* von Leach und nach diesem von Gervais (Apt. IV. p. 230) bildet nach Newport eine andere Art, nämlich:

12. *Lithobius Leachii*.

Newp. Linn. Trans. XIX. p. 368.

13. *Lithobius Sloanei*.

Newp. in Ann. et Mag. Nat. Hist. XIII. p. 96.

Vaterland unbekannt.

14. *Lithobius pilicornis*.

Newp. in Ann. et Mag. Nat. Hist. XIII. p. 96.

England.

15. *Lithobius Argus*.

Newp. Linn. Trans. XIX. p. 369.

Neuseeland.

16. *Lithobius brevicornis*.

Newp. Linn. Trans. XIX. p. 370. *Lithob. Vesuvianus* Costa Mem. Zool. I. p. 60. ?

Neapel.

17. *Lithobius castaneus*.

Newp. in Ann. et Mag. Nat. Hist. XIII. p. 96.

Sicilien.

18. *Lithobius nudicornis*.

Gervais Ann. Sci. Nat. 1837. p. 49.

Sicilien. Höchst zweifelhafte Art.

19. *Lithobius melanops*.

Newp. Linn. Trans. XIX. p. 371.

England.

Passt auf keine unserer deutschen Arten, indem wir keine sechszählige Species haben. Mit *L. erythrocephalus* F. Koch scheint er die meiste Aehnlichkeit zu haben, doch hat dieser nur 20 Augen und nie mehr als 33 Fühlerglieder.

20. *Lithobius platypus*.

Newp. Linn. Trans. XIX. p. 371.

Aegypten.

Vielleicht *Lith. carinatus*.

21. *Lithobius Platensis*.

Gerv. Apt. IV. p. 237.

Montevideo.

22. *Lithobius varius*.

Forstr. Koch, Syst. der Myr. p. 151.

Bayern.

23. *Lithobius glabratus*.

Forstr. Koch, Syst. der Myr. p. 149.

Bayern.



**Verbesserung.**






















S. 25 Z. 8 v. u. l. rundlich statt länglich.






















## Alphabetisches Register.

	Seite
Lithobius aeruginosus . . . . .	74
„ agilis F. Koch . . . . .	52
„ alpinus . . . . .	66
„ americanus Newp. . . . .	89
„ Argus Newp. . . . .	91
„ brevicornis Newp. . . . .	91
„ bucculentus . . . . .	57
„ calcaratus F. Koch . . . . .	70
„ carinatus . . . . .	87
„ castaneus Newp. . . . .	91
„ cinnamomeus . . . . .	77
„ communis F. Koch . . . . .	80
„ coriaceus . . . . .	51
„ crassipes . . . . .	71
„ curtipes F. Koch . . . . .	68
„ dentatus F. Koch . . . . .	54
„ erythrocephalus F. Koch . . . . .	83
„ fasciatus Newp. . . . .	88
„ festivus . . . . .	29
„ forficatus F. Koch . . . . .	39
„ „ var. villosus . . . . .	41
„ forficatus aut. caet. . . . .	89
„ fossor . . . . .	48
„ glabratus F. Koch . . . . .	92
„ granulatus . . . . .	67
„ grossipes F. Koch . . . . .	32
„ Hardwickei Newp. . . . .	89
„ hortensis . . . . .	45
„ immutabilis . . . . .	62
„ impressus F. Koch . . . . .	36
„ inermis . . . . .	65
„ laevilabrum Leach . . . . .	90
„ Leachii Newp. . . . .	91

	Seite
<b>Lithobius longicornis</b> Risso . . . . .	89
" <i>lubricus</i> . . . . .	86
" <i>lucifugus</i> . . . . .	82
" <i>macilentus</i> . . . . .	63
" <i>mexicanus</i> Perbose. . . . .	88
" <i>melanocephalus</i> F. Koch . . . . .	58
" <i>melanops</i> Newp. . . . .	91
" <i>minimus</i> . . . . .	61
" <i>minutus</i> F. Koch . . . . .	84
" <i>montanus</i> F. Koch . . . . .	27
" <i>mordax</i> . . . . .	34
" <i>multidentatus</i> Newp. . . . .	88
" <i>muscorum</i> . . . . .	43
" <i>mutabilis</i> . . . . .	75
" <i>muticus</i> F. Koch . . . . .	79
" <i>nudicornis</i> Gerv. . . . .	91
" <i>parisiensis</i> . . . . .	42
" <i>piceus</i> . . . . .	49
" <i>pilicornis</i> Newp. . . . .	91
" <i>planus</i> Newp. . . . .	89
" <i>Platensis</i> Gerv. . . . .	92
" <i>Platypus</i> Newp. . . . .	92
" <i>punctulatus</i> F. Koch . . . . .	30
" <i>rubriceps</i> Newp. . . . .	88
" <i>Sloanei</i> Newp. . . . .	91
" <i>sordidus</i> . . . . .	47
" <i>spinipes</i> Say . . . . .	89
" <i>sulcatus</i> . . . . .	73
" <i>transmarinus</i> . . . . .	33
" <i>trilineatus</i> . . . . .	37
" <i>variegatus</i> Leach . . . . .	88
" <i>variegatus</i> F. Koch . . . . .	77
" <i>varius</i> F. Koch . . . . .	92
" <i>velox</i> . . . . .	56
" <i>venator</i> . . . . .	59

Tab. I

 1.	 2.	 3.
 4.	 5.	 6.
 a      b 7.	 8.	 9.
 10.	 11.	 12.
 13.	 14.	 15.
 16.	 17.	 18.
 19.	 20.	 21.

		
22.	23.	24.
		
25.	26.	27.
		
28.	29.	30.
		
31.	32.	33.
		
34.	35.	36.
		
37.	38.	39.
		
40.	41.	42.







In der Verlagshandlung von J. L. Lotzbeck in Nürnberg sind nachfolgende grosse, naturgeschichtliche Werke vollendet und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

**Herrich-Schäffer, Dr. G. A. W., die wanzenartigen Insekten.** Getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben. I—IX. (letzter) Band. 1831—1852. (I.—III. Band 1. Heft ist vom verstorbenen Dr. C. W. Hahn bearbeitet.) Jeder Band 6 Hefte, ausser dem 9. Bande, welcher 9 Hefte hat. Jedes Heft mit 6 fein colorirten Tafeln und 1—2 Bogen Text. gr. 8. Velin br.  
1 fl. 30 kr. oder 25 Sgr.

Das ganze Werk complet 85 fl. 30 kr. oder 47 Thlr. 15 Ngr.

**Koch, C. L., die Arachniden.** Getreu nach der Natur abgebildet und beschrieben. I.—XV. Band à 6 Hefte. XVI. Band 4 Hefte. (Schluss.) (Der I. und II. Band ist vom verstorbenen Dr. C. W. Hahn.) 1831—1848. gr. 8. Jedes Heft mit 6 gemalten Kupfertafeln und 1—2 Bogen Text. Velin. 1 fl. 30 kr. oder 25 Sgr.

Das ganze Werk complet 141 fl. oder 78 Thlr. 10 Sgr.

— — Uebersicht des **Arachnidensystems**. 11 Hefte. 1837 bis 1851. gr. 8. Velin. br. complet 14 fl. 42 kr. oder 8 Thlr. 5 Sgr.

— — Verzeichniss der in den 16 Bänden des Werkes: die Arachniden von C. W. Hahn und C. L. Koch vorkommenden Arten und Synonyme. **General-Index**. 1849. gr. 8. Velin. br.  
54 kr. oder 16 Sgr.

— — die **Pflanzenläuse Aphiden**. Getreu nach dem Leben abgebildet und beschrieben. 9 Hefte. Jedes Heft mit 6 color. Tafeln und 2—3 Bogen Text. gr. 8. Velin. br.  
1 fl. 45 kr. oder 1 Thlr.

Das ganze Werk complet 15 fl. 45 kr. oder 9 Thlr.

**Küster, H. C., ornithologischer Atlas**, oder naturgetreue Abbildungen der aussereuropäischen Vögel. 1834—1841. 1. bis 17. (letztes) Heft. (I.—VI. Heft ist vom verstorbenen Dr. C. W. Hahn.) Jedes Heft mit 8 fein colorirten Tafeln. gr. 8. Velin. br.  
1 fl. 30 kr. oder 25 Sgr.

Das ganze Werk complet 25 fl. 30 kr. oder 14 Thlr. 5 Sgr.

**Fauna boica**, bearbeitet von J. E. v. Reider und Dr. C. W. Hahn:

1) **Bayern's Amphibien**, mit 24 color. Tafeln. gr. 8. geh.  
2 fl. 24 kr. oder 1 Thlr. 15 Sgr.

2) **Bayern's Säugethiere**, mit 60 color. Tafeln. gr. 8. geh.  
6 fl. oder 3 Thlr. 21 Sgr.

**Hahn, Dr. C. W., gründliche Anweisung, Krustenthier, Vielfüsse und Asseln, Arachniden und Insekten aller Klassen zu sammeln, zu präpariren, aufzubewahren und zu versenden.** 8. br.  
54 kr. oder 15 Sgr.

**Seelig, B., naturgeschichtliche Tabellen: Pflanzenreich 2**  
Tafeln. Steinreich 2 Tafeln. Thierreich 4 Tafeln.  
gr. Fol. 36 kr. oder 10 Sgr.



